

卷

八

吉慶堂



夫氣者水也
母血者氣所
化非氣無以
生血非血無
以養氣故特
水不瀾則血
不流而氣亦
不運也亦不
通而血亦不
化水者乃特
氣之不流也
血而放水也

○浮腫

經中 式之理在氣之運行 西吳 養氣以子傳
西樓 狂 慎憐憐子參詳 天都 查 望子同安
長方論曰婦人經水不通則化為血而不得化者水氣
水斷絕後至四肢浮腫致小便不通為水腫也
因小便不通後身面浮腫致經水不通為血腫也
不通而化為水流走四肢恐皆腫滿也
實非水也用人參丸

薛氏曰按河陰因飲食起居失養或因六淫七情失調
肝動損不能生發統攝氣血運行失常者先斷經水

婦人經水不通則化為血而不得化者水氣水斷絕後至四肢浮腫致小便不通為水腫也

濟陰綱目卷之七

關中 武之望叔卿父著輯 西吳 費家琰子傳父訂正

西陵 汪 淇懌子箋評 天都 查 望于周父叅閱

○浮腫

夫氣者水之母血者氣所化非氣無以生血非血無以養氣若經水不通則血病血病氣亦病豈有水不通而能化血乎血不通而化水者乃是氣壅不能化血而成水也

良方論曰婦人經水不通則化為血血不通復化為水故先因經水斷絕後至四肢浮腫致小便不通名曰血分宜用椒仁丸若先因小便不通後身面浮腫致經水不通名曰水分宜葶藶丸經水不通而化為水流走四肢悉皆腫滿亦名血分其證與水證相類實非水也用人參丸

薛氏曰按前證或因飲食起居失養或因六淫七情失宜以致脾胃虧損不能生發統攝氣血乖違行失常道若先斷經後浮腫此

觀椒仁丸可
想矣

血凝成癥固
而致腫當知
此症

宣

腎虛則水不
利而散溢妄
行故用腎氣
丸加減

血化為水名曰血分宜椒仁丸治之若先浮腫後經水不通此水
化為血名曰水分宜用葶藶丸治之此屬形氣不足邪淫隧道必
用此藥以宜導其邪而佐以補轉元氣之劑庶使藥力有所仗而
行則邪自不能容而真氣亦不至於復傷矣大凡月水不通凝結
於內久而變為血瘕血水相并亦為水腫

李氏曰經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水閉塞胞門比水腫
更難治但能調其經則水自消小調經散葶藶丸先浮腫而後經
水不通名曰水分乃脾不能制血與水并浮飢肉為之虛腫經磬
丸通用腎氣丸水分君澤瀉加防己葶藶水通血分君牡丹皮加
半膝紅花有經閉脚腫者桑白皮散

治方

血凝成癥固而致腫當知此症
椒仁丸
治先因經水斷而後至四肢浮腫小便不通血化為水

血既化而為水則以利水為先而行血溫血開結破氣又不可少者然非峻利氣悍之物不可故又佐之以大毒之藥

此必已試有成驗者讀之令人胆壯

無水病故先利水而又佐

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化為水

名曰血分

椒仁

續隨子

去皮研

甘遂

附子 炮

郁李仁

黑牽牛

五靈脂

研碎

當歸

吳茱萸

延胡索

各五錢

芫花

醋浸

石膏

各一錢

膽礬

信砒

各一錢

蜣毒

糯米炒黃去頭翅足

斑貓

糯米炒黃各十個

右為末。麴糊丸如豌豆大。每服一九。橘皮湯下。此方藥雖峻利所用不多。若畏而不服。有養病害身之患。當治虛弱之人。亦未見其有誤也。

葶藶丸

治先因小便不利後至身面浮腫經水不通水化為血

名曰水分

以曰木耆助
土以防水土也

濟陰綱目

卷七

二

本草綱目

甜葶藶炒另研

續隨子去殼另研各五錢

乾笋末一兩

右為末。棗肉丸如桐子大。每服七丸。煎扁竹湯下。○如大便利

者。減續隨子。葶藶各一錢。加白朮五錢。

人參一名葶藶

治經脉不利。血化為水。流走四肢。悉皆腫滿。名

曰血分。其候與水相類。若作水治之。非也。宜用此方。

人參

當歸

大黃濕紙裏飯上蒸熱切炒

桂心

瞿麥穗

赤芍藥

白茯苓各半兩

葶藶炒另研一錢

右為末。煉蜜丸如桐子大。每服十五丸至三十丸。空心米飲

下。

小調經散。

治敗血停積五臟。日久腐爛成水。變為浮腫。忌用利

水之藥。產後浮腫亦宜。

此重在敗血。故此忌用利水。所謂調經水自消。

當歸歸

甘草各一

細辛

鹿藿各五

水所調經
水之藥產後浮腫亦宜

當歸

赤芍藥

桔心各一兩

沒藥

琥珀

甘草各一錢

細辛

麝香各五分

右為末每服五分溫酒入薑汁調服

桑白皮散

治腳氣感發兩腳浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐

臥不得

此係腳氣方借用也

桑白皮

炒一錢

郁李仁

炒一錢

赤茯苓

二錢

水香

防已

酒洗

大腹皮

各五錢

蘇子

木通

檳榔

青皮

各七分半

右剉一服加生薑三片水煎服

正腕散

治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大便秘澀兼治

脾虛不能制水而氣不降者宜之

腳氣

白朮

川芎

水香

檳榔

甘草各七錢半 大腹皮 紫蘇 木瓜

陳皮 沉香 獨活各一兩

右咬咀每服三錢水煎食後服

大調經散 治榮衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿

大豆炒去皮一兩半 茯苓 真琥珀一錢

右為末每服一錢濃煎烏豆紫蘇湯下

大腹皮飲 治婦人血嬰重腹腫即真單腹脹也

大腹皮 防己 木通 厚朴 括蕢

黃蓍 枳殼 桑白皮 大黃 陳皮

五味子各等分

右坐每服一兩水煎去滓八酒少許服

此開鬼門潔淨府法皆在氣分而不在于血不調增寒自汗乃邪在表也
血嬰之名甚新謂單腹脹如抱嬰癰之狀也然皆用行氣藥也黃芪五味大黃又可以補氣而行血

散散何狀
大黃甘遂湯
治婦人小腹滿痛如青黃狀小便微澀而不通者
者惟水與血并結血室也

散散何狀

甘遂藥也
恐太多

肝經之脉環
陰器故見証
如是而治法
亦如是也

右坐每服一兩水煎去滓八酒少許服
大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如鼓狀小便微微而不竭產後
者惟水與血并結血室也

大黃 牛兩 甘遂 炮 阿膠 炒各 二兩

右剉每服二錢水一盞煎七分服其血當下

○前陰諸疾

○論陰戶腫痛

良方論曰婦人疝瘕一名便癰一名便毒俗名瘡子或肝經濕熱
下注或鬱怒傷損脾肝其外證或兩拘小腹腫痛或玉門癰腫作
痛或寒熱往來增寒壯熱其內證或小便澀滯或腹內急痛或小
腹痞悶或上攻兩脇或晡熱重墜著兩拘小腹腫痛肝經濕熱壅
滯也用龍膽瀉肝湯玉門腫脹肝火血虛也用加味逍遙散及龍

以不閉屬虛
故宜補以脾
痛屬是故宜
涼

膽瀉肝湯加水香。若槩投散血攻毒之劑，則誤甚矣。○又曰：婦人陰腫，因胞絡素虛，風邪客之，乘於陰部，血氣相搏故也。○薛氏曰：婦人陰腫，若氣血虛弱，用補中益氣湯舉而補之。肝經濕熱，用龍膽瀉肝湯滲而清之。○李氏曰：陰戶兩傍腫痛，手足不能舒伸者，用四物湯入乳香、沒同搗成餅，安陰中，立効。○陰腫痛極，便秘欲死者，枳實、芍藥，但腫痛者，四物湯加柴胡、山梔、牡丹皮、龍膽草，如時常陰腫者，四物湯加藁本、防風。○陰戶腫痛不閉者，逍遙散十全大補湯，腫消不閉者，補中益氣湯，腫痛者，加山梔、牡丹皮。○濕痒出水又痛者，憂思過也，歸脾湯加柴胡、山梔、牡丹皮、芍藥、生甘草。○潰爛者，逍遙散。○陰戶腫痛不閉，寒熱溺澀，體倦少食者，補中益氣湯加升麻、柴胡，至一錢，量八茯苓、山梔。○陰戶不閉，小便淋

益氣湯加升麻此藥至一錢量八茯苓山梔。陰戶不開小便淋

瀝腹中一物攻動脹痛者逍遙散加柴胡山梔車前子

○論陰痒生蟲

陰痒生虫當與腸胃求食之虫不同仲景曰風三虫此當從風木所化故治法悉以清肝為主

大全云婦人陰痒者是蟲蝕所為三蟲在於腸胃之間因臟虛三蟲動作蝕於陰內其蟲作熱微則為痒重者乃痛也○薛氏曰前證屬肝經所化當用龍膽瀉肝湯逍遙散以主其內外以桃仁研粉和雄黃末或鷄肝納陰中以制其蟲○一婦人胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中悶痒小便赤澀此鬱怒傷肝脾所致用歸脾湯加山梔而愈復因怒患處并小腹脹痛用小柴胡加山梔芍歸芍藥痛止用逍遙散加山梔而愈又因勞役患處腫脹小便仍澀用補中益氣加山梔茯苓丹皮而痊○一婦人陰內痛痒不時出水食少體倦此肝脾氣虛濕熱下注用歸脾加丹皮山

少司馬

卷一

三

三兩易

梔子藥甘草主之而安。○一婦人陰內痒痛。內熱倦怠。飲食少思。此肝脾鬱怒。元氣虧損。濕熱所致。用參耆歸米陳皮柴胡炒梔車前升麻芍藥丹皮茯苓而瘥。若陰中有蟲。痒痛亦屬肝木。以桃仁雄黃研納陰中以殺之。仍用清肝解鬱之藥。有以雞肝納之者。乃取蟲之法也。一方搗新桃葉綿裹。納陰中。日三兩易。李氏曰。陰中生蟲。屬如小蛆者。乃濕熱甚。而心氣又鬱。氣血凝滯而生。宜藿香養胃湯補心湯。硫鯉丸。外用生艾汁調雄黃末燒烟薰之。更用雄黃銳散納陰中。○陰中生細蟲。痒不可忍。食入臟腑。卽死。令人發寒熱。與勞證相似。先以蛇床子煎湯洗淨拭乾。後用梓樹皮焙乾爲末。入枯礬四分之一。麝香少許。敷之立効。○如下疽生蟲。所下如柿汁臭穢。及心中疔痛。悶絕虛煩。甚者不治。

疽生蟲所下如補汁臭穢及心中疔痛悶絕虛煩甚者不治

論諸陰戶生瘡

若論諸痛痒瘡當從手少陰若以瘡在下部當從足少陰

俱屬肝胆之火少分虛是求治以腫痛屬血虛肝熱濕痒為脾虛肝熱淋瀝屬

大全云婦人少陰脈數而滑者陰中有瘡名曰匿或痛或痒如蟲行狀膿水淋瀝亦有陰蝕幾盡者皆由心神煩鬱脾胃虛弱致血氣流滯耳故經云諸痛痒瘡皆屬於心又云陽明主肌肉治之當補心養胃外以薰洗坐導藥治之乃可薛氏曰婦人陰中生瘡乃七情鬱火傷損脾肝濕熱下注其外證有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻突如餅俗呼陰菌亦有如雞冠花亦有生諸蟲亦有腫痛濕痒潰爛出水脹悶脫墜者其內證口乾內熱體倦經候不調或飲食無味肺熱發熱胸膈不利脇肋不調小腹痞脹赤白帶下小水淋瀝其治法腫痛者宜用四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍膽草濕痒者宜用歸脾湯加山梔牡丹皮柴胡淋瀝者宜用龍膽瀉

肝腎有熱。○腐潰屬肝脾。○腫脫為不足有火故其立方如此。

此即陰癰有謂藥本一味能治婦人癰疔以其升舉太陽之氣也。但與虛而下墜者非宜。

肝湯加白朮牡丹皮。潰腐者宜用加味道遙散。腫悶脫墜者宜用補中益氣湯加山梔牡丹皮佐以外治之法。

○陰挺下脫

大全云婦人陰挺下脫或因胞絡傷損或因子臟虛冷或因分娩用力所致。○薛氏曰陰挺下脫當升補元氣為主。若肝脾鬱結氣虛下陷用補中益氣湯。若肝火濕熱小便澀滯用龍膽瀉肝湯。○一婦人陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱脯熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結蓋肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而重墜也。先以補中益氣加山梔茯苓車前子青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外以生豬脂和藜蘆末塗之而收。○一婦人陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋瀝小便澀滯久與龍膽瀉

肝湯分利濕熱。朝與補中益氣湯升補脾氣。諸證漸愈。再與歸脾湯加山梔、川芎、茯苓、黃蘗間服。調理而愈。後因勞役。或怒氣下部濕痺。小水不利。仍用前藥即愈。

○論陰冷

良方云。婦人陰冷。因勞傷子臟。風冷客之也。○薛氏曰。陰冷屬肝。經有濕熱。外乘風冷所致。若小便澀滯。或小腹疼痛。用龍膽瀉肝湯。若內熱寒熱。或經候不調。用加味逍遙散。若寒熱體倦。飲食少思。用加味四君子湯。若鬱怒發熱。少寐懶食。用加味歸脾湯。○一婦人陰中寒冷。小便黃澀。內熱寒熱。口苦脇脹。此因肝經濕熱。用龍膽湯祛利濕熱。用加味逍遙散調補氣血而安。○一婦人所患同前。更寒熱嘔吐。兩股腫痛。先用小柴胡加山梔二劑。寒熱嘔吐

有一婦患此
每交感後輒
面黃如蠟外
終身不育

頓止。次用龍膽瀉肝湯一劑頓消。一婦入陰中寒冷小便澄清

腹中亦冷飲食少思大便不實下元虛冷治以八味丸月餘飲食

漸加大便漸實又月餘諸證悉愈

○論交接出血作痛

薛氏曰。女人交接輒出血作痛。此肝火動脾而不能攝血也。用補

中益氣湯。濟生歸脾湯。若出血過多而見他證。但用前藥調補肝

脾。

○論傷丈夫頭痛

薛氏曰。女人交接傷丈夫頭痛。當用補中益氣湯六味地黃丸以

滋化源為主。

補遺局方。來復丹治婦人與男子交接相傷。因而四肢沉重頭痛

皆暈米飲和之五十九

昏暈米飲吞下五十丸

○脉法

脉經曰少陰脉滑而數者陰中生瘡○少陰脉弦者白腸必挺核

○治陰戶腫痛

龍膽瀉肝湯治肝經濕熱下部兩拘腫炊作痛小便澀滯陰挺

如菡或出物如蟲等證

龍膽草酒炒

澤瀉各一錢

車前子炒

木通當歸酒拌

生地黄酒炒

山梔子炒

黃芩炒

生甘草各五分

右剉水煎服○玉門腫脹加木香

加味四物湯治陰戶腫痛

當歸

川芎

芍藥

生地黄

瀉肝而兼導赤瀉其子也瀉肝而用利水肝主疎瀉也龍胆山梔假以降火當補生地以滋肝陰生甘草緩肝之急炒黃芩助肝之氣

柴胡 山梔子 牡丹皮 龍膽草

右剉水煎服。

九味柴胡湯。治肝經濕熱下注。便毒腫痛。或小腹脇肋結核。凡

肝膽經部分一切瘡瘍。或風熱結核。癰癤。並皆治之。

柴胡 黃芩炒各一錢 人參 山梔子炒 半夏

龍膽草炒焦 當歸 芍藥炒 甘草各五分

右剉水煎服。

加味小柴胡湯。治肝經下部腫脹。小便不利。或寒熱往來。或胸

熱。或胸脇作痛。

柴胡二錢 黃芩炒一錢 人參 半夏

山梔子 牡丹皮各七分 甘草

肝脾 加味逍遙散 治婦人經閉血虛。濕熱流注下部。陰內潰爛。疔瘡。

肝脾

右劉加生薑水煎服。

加味逍遙散。治婦人腫脾血虛。濕熱流注下部。陰內潰爛痒痛。

發熱。肺熱。寒熱等證。

當歸

芍藥

白朮炒

茯苓

甘草

炙各一錢

柴胡

牡丹皮

山梔

炒各五分

右剉水煎服。外以鶴風草煎湯洗。

菖蒲散。治婦人陰戶腫痛。月水澀滯。

菖蒲

當歸各一兩炒

秦艽一兩

吳茱萸

製五錢

右為末。每服五錢。空心葱湯調下。或水煎服。

麻黃湯洗方。

治婦人陰腫。或瘡爛。

麻黃

黃連

蛇床子

各一兩

牡艾葉

一兩半

烏梅十箇

其妙又在麻黃以麻黃氣

陰戶屬厥陰。腫痛則氣壅。血聚。故用此四味。以行心肝之氣血耳。尤妙在葱湯。

悍能開竅而通氣也艾葉煖其下以其瘡爛故又佐以連床烏梅云

陰腫者肝木之風也以防風瀉肝木之風邪以艾葉溫厥陰之結氣大戟瀉腫消毒故加之消熱腫

知石者氣凝血滯也厥陰

右判細以水一斗煮取五升去滓熱洗避風冷

經心錄方治婦人陰中腫痛不可忍

艾葉五兩防風三兩大戟二兩

右判細以水一斗煮取五升熱洗日三次宜避風冷

白礬散治婦人陰腫堅痛

白礬半兩甘草半分大黃一分

右為末水和如丸棗大綿裹內陰中日兩換以愈為度

黑白散治婦人陰中腫痛

小麥朴硝白礬五倍子葱白

右生煎湯頻洗

枳楮熨治婦人陰腫如石痛不可忍二便不利

用此藥之是行其氣耳

枳實

陳皮

右二味炒令香熟以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處頻頻

之經環陰器
用此熨之足
石其氣耳

次精平肝熱
甘菊清肝熱
而散
馬鞭草散肝
血

陰痒總是心
肝二火游行

枳實

陳皮 各四兩

右二味炒令香熟以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處頻頻熨之冷則又換直至喉中覺枳實氣則痛止腫消便利矣

雜方 治婦人陰中腫痛

用枳實半觔切碎炒熟布裹包熨之冷即易 一方用枳殼

一方用鐵精粉傅上 一方以甘菊苗研爛百沸湯淋洗熏

浸 一方用馬鞭草搗爛塗之

○治陰痒生蟲

大黃散 治婦人陰痒

大黃 微炒

黃芩

黃蓍 炙各一兩

赤芍藥

玄參

丹參

山茱萸

蛇床子 各半兩

右為細末。每服二錢。食前溫酒調服。

硫鯉丸。治陰中生蟲。亦治茄子疾。

大鯉魚一個。去頭皮。八硫黃一兩。黃泥固。用火煨。烟盡為末。米糊丸如桐子大。每服二十丸。溫酒下。

廣濟方。療婦人陰痒不止。

蚬蛇膽 雄黃 硫黃 朱砂

硝石 蕪荑 各半 藜蘆 二錢

右為細末。以臘月豬脂和如膏。用故布作纏子。如指長一寸半。以藥塗上。兩陰中日一易之。易時宜用豬椒根三五兩。水煮硝熱洗乾拭內之。

一方。治陰中生細蟲。痒不可忍。若食八臟腑即死。

生虫。繇穢惡。不潔。外治無非殺虫。內治無非清火。養陰。先師云。二。思此。日用。執。水。洗。滌。數。次。百方不效。後。隨夫住至山。東。食。小。米。飯。數。月。而。愈。豈。亦。補。土。而。制。溫。歟。觀。此。則。治。法。又。須。補。脾。燥。濕。矣。姑。試。之。

不止。不致。音。人。日。誦。觀。音。

右和一處。研勻。敷之。立。效。

一婦固陰痒
不止不敢告
人曰請觀音
經夢一老嫗
教以用吳茱
萸苦參煎洗
而愈

梓樹皮

焙乾為末二錢

枯礬 五分

麝香 少許

右和一處研勻敷之立効

又方

桃仁雄黃研勻納陰中仍服清肝解鬱之藥

又方

蛇床子白礬煎水淋洗即止

又方

狼牙二兩蛇床子三兩以米三升煮汁沸熱洗

又方

取牛肝或豬肝截五寸繩繫內陰中半日蟲入肝取出立

効

又方

取鷄肝乘熱內陰中如有蟲當盡下

又方

新桃葉搗爛綿裹納陰中曰三兩易

又方

生艾汁調雄黃末燒烟薰之更用雄黃末納陰中

聖惠方

療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白多

氣思美食。

用鯉魚長一尺。去頭肉。取骨搗末。熬黃黑。以豬脂和。以絹袋盛。如常法納陰中。至痛處即止。蟲當自出。

崔氏療陰痒不可忍方。

杏仁燒作灰。乘熱綿裹納陰中。日二易之。

又方。蒜煮湯洗之。○一方用枸杞根煎湯洗。

又方。小蘗不拘多少。水煎作湯。熱洗。日三次。

○治陰戶生瘡。

補心湯。治婦人陰戶生瘡。名曰匿瘡。或痛或痒。如蟲行狀。膿水

淋瀝。陰蝕已盡。治之當補心養胃。

人參

茯苓

前胡

半夏

湯泡

川芎

各七錢半

湯名補心。我不知其所以。補能治陰瘡。我不知其所以。以治。惟問之。

知者

陳皮

枳殼去穢炒紫蘇

桔梗

乾薑

甘草

各五錢當歸

白芍藥各兩

熟地黃一兩半

右剉每服四錢加薑棗煎服。○如濕熱有蟲者去薑蘇參梗四

味加苦參壯艾桃仁吳茱萸水炒黃連

此名養胃固宜第以陰中生瘡而歸之陽明經虛豈以失生氣而自腐歟以此而推則食小米而陰屬乃愈者亦此意也

藿香

薏苡仁

神麴炒

烏藥去木

砂仁

半夏麴

茯苓

白朮

人參各五分葶澄茄

甘草各三分半

右剉薑棗煎服

一方治陰內生瘡膿水淋瀝或痒痛

升麻

白芷

黃連

木通

此方清熱導濕治直排膿

平倉司

卷之五

一二

生肌乃太陰
陽明少陰厥
陰正法也

卷七

當歸 川芎 白朮 茯苓

右剉水煎服。更用場腫湯浴洗。

場腫湯 治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋瀝

甘草 乾漆各三錢 生地黄 黃芩

當歸 川芎各二錢 鼈甲炙五分

右剉作一劑。用水數碗煎數沸去滓。時常洗患處。

治陰瘡

蕪荑 川芎 黃芩 甘草 黃連

白芷 附子 礬石 雄黃各六錢

右咬咀。取豬脂四兩合煎。傳之。

治婦人陰瘡。與男子妬精瘡大同小異方。

蛇床子 研極 白蛇皮 一條 硫黃 各半

黃丹 枯白礬 篇蓄 藁本各一兩 荆芥

蛇床子研極細 白蛇皮一條燒灰 硫黃各半兩

右為細末另以荆芥蛇床子煎湯溫洗軟帛溲乾清油調塗如瘡濕乾末搽之

治疔瘡因月後便行房致成湛濁伏流陰道疔瘡遂生搔痒無時

先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却服後藥

黃蓍鹽水炙 兔絲子酒浸 沙苑蒺藜炒

黑牽牛 赤石脂 龍骨

右為末煉蜜丸桐子大每服二十丸燕窩蒸酒澄上清者吞下

黃芩湯洗方 療婦人陰中生瘡

當歸 大黃 黃芩 川芎 雄黃

活血清熱燥濕殺蟲

以補藥配牽牛以燥濕合通利何也

燕窩酒奇

礬石各二分 黃連一分此方中有云分者音作念每一分二錢半也

右切以水五升取四升洗瘡日三度

雄黃散

治血開結殺虫

雄黃 川芎 當歸 北細辛

川椒 藜蘆 辰砂

右為末綿裹所陰中又傳外瘡止忌如常法

當歸 川芎 芍藥 甘草各二兩

地榆三兩 一方有蛇床子不用川芎

右細切以水五升煮取三升去滓熏洗日三夜二

又方

燥濕生肌

五倍子 甘草 滑石 黃丹各等分

時疫方 治婦人金白土黃作辛或痛

燥濕生肌

五倍子

甘草

骨石

黃丹 各等

燥濕移虫

右為末先以甘草湯洗然後傳之

肘後方。治婦人陰戶生瘡作痒或痛。

杏仁炒

雄黃

白礬各五錢

麝香二分

右為細末傳入陰中。一方單用硫黃研細傳之亦効。

銅綠散。治男婦陰部濕淹瘡。

燥濕去腐生肌

五倍子

五錢

白礬

一錢

乳香

五分

輕粉

一字

銅綠少許

右為末洗淨瘡之

麝香杏仁散。治婦人陰瘡。

麝香

少許

杏仁

不拘多少燒存性

右為細末如瘡口深用小絹袋子二個盛藥滿擦口臨上床灸

熱安在陰中立愈。

又肝開竅殺虫

栢蛤散 治下疳濕瘡

黃柏 以磁鋒刮末

蛤粉 各等分

右摻上即愈。蓋黃柏去熱，蛤粉燥濕，故也。

胃氣殺虫除熱

又方。平胃散加貫衆末。每服二錢。煮熟豬肝拌藥。內陰戶數日可安。

○治陰痔

治婦人陰中生痔。九竅有肉突出者。皆名爲痔。

用烏頭七箇。燒存性。用小瓦罐盛。醋淬之。乘熱熏候通手。沃之良。

洗方。治茄子疾。

肉突爲痔。人膏未諳。烏頭醋洗亦所未知。

茄皮

白礬

馬椿頭根

朴硝

右煎水熏洗

澤蘭

石灰炒少許

右煮水熏洗

傳藥 治茄子疾

朴硝爲末黃荆柴燒漚調敷或濃鐵漿水調傳

又方 治茄子疾心躁連綿黃水易治白水難愈用

生枳殼爲散煎湯熏洗却用線帛包枳殼澤納八陰中即日

漸消

○治陰挺下脫

當歸散 治婦人陰中突出二物長五六寸名陰挺又名癰疽

當歸 黃芩各一兩 牡蠣半兩 蛭皮炙一兩 赤芍藥五錢

右爲末每服二錢食前溫酒調下滾湯亦可如不應更以補中

延壽

此藥湯倍加升麻柴胡兼服之

又方治陰挺

當歸

穿山甲

蒲黃

炒各半兩

辰砂

一錢

麝香

少許

右為末每服二錢酒調下尤効

三葉丸

治陰中生一物所大牽引腰腹膨脹痛至甚不思飲食

皆因多服熱藥及煎燂或犯非理房事兼意淫不遂名陰挺

食茱萸

吳茱萸

湯浸微炒

山茱萸肉

舶上懷香

白蒺藜

桔梗

慢火炒

青皮

去白各一兩

五味子

海藻

洗焙

大腹皮

酒洗晒乾

川練子

去核

玄胡索

各一兩二錢半

右為末酒糊丸如桐子大每服三十五丸水通湯下○下虛加

川烏炮去皮肉桂去粗皮各一兩腰腹痛甚加桃仁去皮尖

一方每服一錢生地黃湯調乃用金毛狗脊五倍子白礬水湯

此是肝家藥

炒別研青皮去白、枳實、生薑各一兩、真南木香、土錢半、服之。○
一方每服二錢、生地黃湯調、仍用金毛狗脊、五倍子、白礬水湯
根、魚腥草、山黃連各一兩、為散、分作四服、以有諸症、確煎熟、預
以銀錫作一長小筒、下透確、精上貫挺上、先熏後洗、立効、更
服白薇散、凌霄花少許煎。

一捻金丸 服前藥未効却用此

玄胡索 舶上懷香 吳茱萸 炒川棟子 去核青木香 各二兩

右為末、粳米飯糊丸、如桐子大、每服三十五丸、空心未通湯服、
又用梅花腦子半錢、鐵孕粉一錢、水調刷上、如陰畔生瘡、以涼
血餘、每服三錢、加凌霄花少許煎、空心服立効。

腦子辛寧透
鐵孕粉以金

治婦人陰挺出下脫方

齊集圖目

卷七 治陰挺下脫方

十六

平肝散而制之誠殆往之正也

桂心一方作川椒

吳茱萸一兩生用

戎鹽二兩

右藥並炒令色變。搗羅爲末。以綿裹如指大。內陰中。日再易之。甚妙。

又方。川椒

川烏頭並生用

白芨各半兩

右搗羅爲末。綿裹一錢。內陰中。深三寸。腹中熱即止。來日再用之。

又方。蛇床子五兩

烏梅二枚

武叔卿先生著

以水五升。煮取三升。去滓。稍熱洗之。每日夜三五度用。

又方。硫黃

烏鰂骨各半兩

搗羅爲末。傅之。

又方。

鐵精細研。以羊脂調。布裹炙熱。熨之以瘡爲度。

又方。

用羊脂煎令適冷。煖取塗上。以鐵精傅之。多少令調。以火

灸布煖臍臍上漸塗肉之然後未磁石酒服方寸七日三

熏洗法

用荆芥穗臭椿樹皮藿香葉煎湯熏洗即入

托藥用草麻子葉有九角者好飛過白礬為末以紙片攤藥托

入

摻藥先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬為末乾摻立効

敷藥用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒烟熏次用草麻子研爛塗

上吸入如入即洗去

○治陰冷

五加皮浸酒方治婦人癰瘕陰冷

五加皮 乾薑 丹參 蛇床子 熟地黃

搥是寒者濕之而地骨天

門又所以清
上而塞下也

枸杞九佳

杜仲各三兩

地骨皮

天門冬各一兩

鍾乳粉四兩

右剉碎以生絹袋盛用酒十五觔漬二宿每服一盞空心食前
飲之。○一方用枸杞子無地骨皮

八味丸 治血弱不能榮養臟腑津液枯澁風寒客於子臟以致
陰冷

熟地黄

牛斤

山茱萸肉

乾山藥

各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉各三兩

肉桂

附子

各一兩

右爲末和地黄膏加煉蜜爲丸如桐子大每服七八十丸
食前白滾湯下

治婦人陰冷方

遠志

乾薑

蓮花

各半兩

蛇床子

五味子各一兩

右搗羅為末。每用兼以兔糞塗陰門。用綿裹一錢。內陰中。熱即為効。

又方。蛇床子 吳茱萸 甜葶藶各半兩 沒石子 一枚

右為末。綿裹。黃許大。內陰中。令腹內熱為度。

又方。蛇床子一兩 吳茱萸生用一兩半 一方用麝香

右為末。煉蜜。凡如酸棗大。以綿裹。納陰中。下惡物為度。

溫中坐藥。用蛇床子為末。白粉少許和勻。如棗大。綿裹。納之。自

然溫熱有効。

又方。吳茱萸入牛膽中。令滿。陰乾百日。每取二十粒。研碎。帛裹

納陰中。良久如火熱。

治交接血作痛

千金方 治女人交接出血

桂心

伏龍肝各五錢

右為末酒服方寸匕瘥止

又方

黃連

六分

牛膝

甘草

各四分每一分二錢半也

右細切以水四升煮取二升洗日三四度瘥

又方

亂髮

青皮

二味燒灰敷之

又方

用熟艾緊裹一團然後以綿裹內陰中

集驗方

療女人交接陽道違理及他物所傷犯血流瀝不止者

取釜底墨斷葫蘆塗藥內之

又方

療女童交接陽道違理血出不止用燒髮并青布末為粉

以何物調塗之

溫養其陰則陽舒而受矣蓋寒則氣閉故致傷焉

按此方嫁痛之故乃肝陽不足宜養肝之陽以陰主陽主開也

傷丈夫則淫慾過也或肝陰不足歟此方既補肝陰復壯肝氣服之自効

塗之。一方割雞冠血塗之。一方以赤石脂末搽之。一方五倍子末搽亦良。

治小戶嫁痛

甘草

生薑

各五分

白芍藥

四分

桂心

二分

右剉以水二升煎四沸服

又方海螵蛸燒為末酒調服方寸匕日三服

又方小麥甘草一味各等分煎湯洗甚効

○治傷丈夫頭痛

集驗方療女人傷丈夫四肢沉重噓吸頭痛

生地黄

八兩芍藥

五兩甘草

三兩香豉

一升葱白

一升生薑

四兩

右以水七升煮取二升半分三服不得重作忌房事

此溫中藥也
於治嘔悶固
宜至頭痛而
用桑皮則莫
為之解

桑白皮湯

治婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔悶

桑白皮

兩半

乾薑

一兩

桂心

五寸

大棗

二十枚

右切以酒一斗煮三四升去滓分溫服衣適厚薄毋令汗出

○附治脚疣

金蓮穩步膏

治婦人脚指縫壞痛

黃連

黃柏

黃丹

荆芥

微炒各等分

右為細末搽脚指縫內布扎縛自然平穩不痛

濟陰綱目卷之七終

關中 武之望叔卿父輯著 武林 何應魁斗文父訂正

濟陰綱目卷之八

關中 武之望叔卿父輯著 武林 何應魁斗文父訂正

西陵 汪 淇懌子箋釋 天都 查 望于周父泰閱

○胎前門上

○論胎屬十二經所養

手少陰動脈
胛在神門於
左右手掌後
內側橫紋下
與開相對者
是也
尺脈更真

虞氏曰脈經云診其脈手少陰之脈動甚者姪子也蓋手少陰心
脈也心主血脈故也又腎為胞門子戶尺中腎脈按之不絕當姪
子也又曰婦人妊娠一月之時足厥陰脈養之二月足少陽脈養
之三月手少陰脈養之四月手少陽脈養之五月足太陰脈養之
六月足陽明脈養之七月手太陰脈養之八月手陽明脈養之九
月足少陰脈養之十月足太陽脈養之是以諸經脈各養三十日

如此治皆得法

也。若夫至期當養之經，虛實不調，則胎孕爲之不安。甚則下血而墮矣。夫手足十二經，氣血盈虧不同。如手足厥陰、太陽、少氣多血，手足太陰、少陰、少血多氣，手足少陽、氣多血少，手足陽明、氣盛血多。安胎之法，宜各按月依經視其氣血虛實而調之。庶無胎墮之患。其或感冒風寒，別生異証，又宜各按法而調治之。

○論治胎產三禁

厥陰肝木乃風化之始，故曰化之源而祖氣乃天直之氣，非穀氣也。東方生風，風生蟲，人亦倮蟲也，故從厥陰風木論。潔古云：治胎產之病，從厥陰經論之，是祖氣生化之源也。厥陰與少陽相爲表裏，故治法無犯胃氣及上一焦。有三禁：不可汗，不可利，小便。發汗則傷上焦之陽，利大便則脈數而動，脾利小便則內亡津液，胃中枯燥。製藥之法，能不犯此三禁，則榮衛自和而寒熱止矣。如發渴則白虎，氣弱則黃耆，血刺痛而和以當歸，腹

中疼而加之為藥大抵產天行從增損柴胡雜証從增損四物

宜詳察脈証而用之

○論胎前調理法

心藏神腎主骨脾主肉故云然

胎前藥最忌群隊故不必多

集略云母之腎臟係於胎是母之真氣子之所賴也受妊之後宜令鎮靜則血氣安和須內遠七情外薄五味大冷大熱之物皆在所禁使霧露風邪不得投間而入亦不得交合陰陽觸動慾火務謹節飲食若食兔缺唇食太無聲食雜魚而致瘡癰心氣大驚而顛疾腎氣不足而解顛脾氣不和而羸瘦心氣虛乏而神不足見從母氣不可不慎也苟無胎痛胎動瀉痢及風寒外邪不可輕易服藥不得已審度疾勢輕重藥性高下不必多品然父少母老產女必羸母壯父衰生男必弱氣受偏痺與之補之補羸女則養

知七損八益
之理者能道

氣實者宜清
熱養血氣滯
者宜理氣安
胎氣虛者宜
補

血壯脾補弱男則壯脾節色羸女宜及時而嫁弱男及待壯而婚昔人論年老有子者男不過八八女不過七七則知血氣在人固自有量夫豈逃陰陽之至數哉

丹溪曰胎前當清熱養血。○產婦因火逼動胎逆上作喘急者急用條芩香附之類爲未調下條芩水中取沉者爲佳。○黃芩安胎乃上中二焦藥能降火下行。○天行不息所以生生而無窮芩附子治血行氣有補陰之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛難產可煎作膏。○條芩白朮乃安胎之聖藥俗以黃芩爲寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱養血使血循經而不妄行乃能養胎。○懷娠嗜物乃一臟之虛如愛酸

使血循經而不妄行乃能養胎。○衰娠嗜物乃一臟之虛加愛酸
物乃肝臟不能養胎而虛也。○有孕八九個月必用順氣須用枳
殼紫蘇梗。

○孕婦食忌

雞肉合糯米食。令子生寸白蟲。○食犬肉。令子無聲。○鯉魚同雞
子食。令子生瘡多瘡。○食兔肉。令子缺唇。○食羊肝。令子多厄。○
食鼈肉。令子項短縮頭。○雞子與桑椹同食。令子倒生心寒。○鮮
魚同田雞食。令子瘡痘。○雀肉同豆醬食。令子面生黥黯黑子。○
食螻蛄。令子橫生。○食生薑。令子多指。○食水漿。令絕產。○食雀
肉飲酒。令子多淫無恥。○食莢菰消胎氣。○食驢馬肉。過月難產。
○豆醬合薑香食之。墮胎。○食山羊肉。令子多病。○食鰕鱔無鱗
魚難產。○食諸般菌。生子驚風而夭。○食雀腦。令子患雀目。

此藥外或有
未盡者可以
類推

孕婦藥忌

歌曰。蛇斑水蛭及蝨蟲。烏頭附子配天雄。野葛水銀并巴豆。牛膝
薏苡與蜈蚣。三稜代赭芫花麝。大戟蛇脫黃雌雄。芽硝芒硝丹皮
桂。槐花牽牛皂角同。半夏南星與通草。瞿麥乾薑桃仁通。礪砂乾
漆。蠟腳瓜。地膽茅根莫用好。

孕婦起居忌

便產須知云。勿亂服藥。勿過飲酒。勿妄針灸。弗向非常地。便勿舉
重。登高涉險。心有大驚。犯之產難。子必癩癩。勿多睡臥。時時行步。
勿勞力過傷。使腎氣不足。生子解顛。腦破不合。衣母太溫。食母太
飽。若脾胃不和。榮衛虛怯。子必羸瘦多病。自家及隣家修造動土。
犯其胎氣。令子破形殞命。刀犯者。形必傷。泥犯者。穀必塞。打擊者。

犯其胎氣。令子破形。頑命刀犯者。形必傷。犯者。數必甚。可擊者。色青點。繫縛者。相拘攣。有此等驗。如影響。切宜避之。

○候胎法

脈經曰。婦人懷軀七月而不可知。時時衄血而轉筋者。此為軀也。

衄時噎而動者。非軀也。○素問云。婦人足少陰脈動甚者。姪子也。

○陰搏陽別。謂之有子。王註云。陰謂尺中也。搏謂搏觸於手也。此脈搏擊與寸脈殊別。則謂有孕之兆。

脈經曰。姪脈初時寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。脈滑疾重以

手按之散者。胎已三月也。脈重手按之不散。但疾不滑者。五月也。

○尺脈左偏大為男。右偏大為女。左右俱大。產二子。大者如實狀。

○婦人姪娠四月。欲知男女法。左疾為男。右疾為女。俱疾為生二

子。王子亨云。姪娠三部俱滑。而疾在左為男。在右為女。○遣姪娠人面南行。還復呼之。左廻

首者是男。右廻首者是女。○看上圖時。夫從後急呼之。左廻首者

素問以足少

陰脈動甚為

有妊。脈經以

手少陰脈動

甚為有妊。豈

心腎同一診

耶。此只言素

問蓋亦有見

實學妙

診在尺脈的

是至論。然于

王子亨之說

亦為票厚者

是男。右廻首者是女也。○婁全善云。按丹溪云。男受胎在左子宮。女受胎在右子宮。斯言大契。是說也。蓋男受胎在左。則左重。故廻首時。慎護重處而就左也。女胎在右。則右重。故廻首慎護重處而就右也。推之於脈。其義亦然。胎在左。則血氣護胎而盛於左。故脈亦從之。而左疾爲男。左大爲男也。胎在右。則血氣護胎而盛於右。故脈亦從之。而右疾爲女。右大爲女也。亦猶經云。陰搏陽別。謂之有子。言受胎處在臍腹之下。則血氣護胎而盛於下。故陰之尺脈鼓搏有力。而與陽之寸脈殊別也。又如癰節發上。則血氣從上。而寸脈盛。發下。則血氣從下。而尺脈盛。發左。則血氣從左。而左脈盛。發右。則血氣從右。脈盛也。丹溪以左大順男。右大順女。爲醫人之左右手。蓋智者之一失也。

丹溪以此診
男女之病原
不診產婦須
知

肝藏血。肺主氣。血爲榮。氣爲衛。陰陽配偶。不參差。兩臟通和。

○診婦人有姪歌

肝藏血兮肺主氣。血爲榮兮氣爲衛。陰陽配偶不參差。兩藏通和
皆類例。血衰氣旺定無娠。血旺氣衰應有體。○寸微關滑尺帶數。
流利往來并雀啄。小兒之脈已見形。數月懷胎猶未覺。○左疾爲
男右爲女。流利相通速來去。兩手關脈大相應。已形亦在前通語。
○左手帶縱兩個男。右手帶橫一雙女。左手脈逆生三男。右手脈
順生三女。○寸關尺部皆相應。一男一女分形証。有時子歿母身
存。或卽母亡存子命。○往來三部通流利。滑數相參皆替替。陽實
陰虛脈得明。遍滿胸膛皆逆氣。○左手太陽浮大男。右手太陰沉
細女。諸陽爲男諸陰女。指下分明長取記。○三部沉正等無疑。尺
內不止真胎婦。夫乘妻兮縱氣衰。妻乘夫兮橫氣助。子乘母兮逆

氣參母乘子兮順氣護。○小兒目足胎成聚身熱脈亂無所苦汗
出不食吐逆時精神結倘其中任滑疾不散胎三月但疾不散五
月母弦緊牢強滑者安沉細而微歸泉路。
神方驗胎散。婦人兩三個月月經不行疑是兩身却疑血滯心
煩寒熱恍惚此藥可驗。

真雀腦芎。一兩

當歸全用重一兩
者只用七錢

右二味爲細末分作二服濃煎好艾湯一盞調下或好酒調服
亦得。可待三兩個時辰間覺臍腹微動仍頻卽有胎也動罷卽
愈安穩無慮如不是胎卽不動所滯惡物自行母亦安也如服
藥不覺效再煎紅花湯調下必有神効。

驗胎方。

經脈不行已經三月者。

胎也。否則經滯。

驗胎方 經脈不行已經二月者

用川芎為細末濃煎艾葉湯空心調下二錢覺腹內微動則有胎也。否則為經滯。

艾醋湯 如過月難明有無或月數未足難明

用好醋炆艾服半盞後腹中若大痛是有孕不為痛定無

探胎散 婦人胎氣有無疑似之間以此探之有胎則吐無則不

吐

皂角 去皮 甘草 炙各一錢 黃連 五分

右為細末作一服酒酒調服

逐月養胎法

北齊名醫徐之才云。妊娠一月名胎胚。飲食精熟酸羹受御宜食大麥毋食腥辛。是謂經正。○妊娠一月足厥陰脈養不可針或其

皂角探胎未有不吐但恐胃弱之婦即無胎亦不免於吐耳

經。如大敦行間太衝中封。
五里中郄等穴是也。足厥陰內屬於肝。肝主筋及血。二月之
時。血行否泄。不為力事。寢必安靜。無令恐畏。

妊娠二月。名始膏。無食辛燥。居必靜處。男子勿勞。百節皆痛。是為

胎始結。

○妊娠二月。足少陽脈養。不可針灸其經。
如膽竅血壅付陽絕骨外立陽

陵泉等穴是也。

足少陽內屬於膽。膽主精。二月之時。見精成於胞裏。當慎

護。勿驚動也。

妊娠三月。名始胎。當此之時。未有定儀。見物而化。欲生男者。操弓

矢。欲生女者。弄珠璣。欲子美好。數視璧玉。欲子賢良。端坐清虛。是

謂外象而內感者也。

○妊娠三月。手心主脈養。不可針灸其經。
如

衝勞宮大陵內關間使。郄門曲澤等穴是也。

手心主內屬於心。毋悲哀思慮驚動。

妊娠四月。始受水精。以成血脈。食宜稻粳。羹宜魚鴈。是謂盛血氣。

衝陽地內關三陽大。手少陽內輪二。在四月之時。見六腑順氣。當

以通耳目而行經絡。○妊娠四月。手少陽脈養。不可針灸其經。開
衝陽地內關三陽天非曲垣等穴是也。手少陽內輪三焦。四月之時。見六腑順成。當
靜形體。和心志。節飲食。

妊娠五月。始受火精。以成其氣。臥必晏起。沐浴浣衣。深其居處。厚
其衣服。朝吸天光。以避寒殃。其食稻麥。其羹牛羊。和以菜菹。調以
五味。是謂養氣。以定五臟。○妊娠五月。足太陰脈養。不可針灸其
經。隱淵大都公孫齊丘三陰交白谷陰陵泉等穴是也。足太陰內輪于脾。五月之時。見四肢
皆成。毋太饑。毋甚飽。毋食乾燥。毋自炙熱。毋大勞倦。

妊娠六月。始受金精。以成其筋。身欲微勞。無得靜處。出遊於野。數
觀走犬。及視走馬。食宜鷄鳥猛獸之內。是謂變腠理。紉筋。以養其
力。以堅背脊。○妊娠六月。足陽明脈養。不可針灸其經。知厲兌豐隆陰市土

下廉三里足陽明內屬於胃主其口目六月之時見口目皆成調等穴是也

五味食甘美毋太飽

妊娠七月始受水精以成其骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以

運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳以密腠理是謂養骨而堅

齒○妊娠七月手太陰脈養不可針灸其經如少商魚際列缺尺澤天府等穴是也

手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭

無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠八月始生土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理

而光澤顏色○妊娠八月手陽明脈養不可針灸其經如商陽二間合谷上

下廉三里曲池肩井肩髃等穴是也手陽明內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅

皆成無食燥物無輒失食無忍大起

帶自持而待之是謂養毛髮致才力○妊娠九月足少陰脈養不

皆成無食燥物無輒失食無忍大起

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩
滯自持而待之是謂養毛髮致才力○妊娠九月足少陰脈養不
可針灸其經如湧泉然谷太谿文信築憤伏溜等穴是也足少陰內屬於腎腎主續續
九月之時兒脈續續皆成無虛濕冷無著灸衣
妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使開節人神
皆備但俟時而生

妊娠一月始胚二月始膏三月始胞四月形體成五月能動六月
筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月諸神備即
產矣宜服滑胎藥八月即服

烏雌雞湯 妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重
腰痛腹滿胞惡卒有所下當預安之宜服此

胎始一月生
氣方濃傷之
則薄矣故用
溫升之藥以
助之然於丹
溪清熱養血
之語須看

烏雌雞

一隻治如食法

茯苓

阿膠

各二兩 吳茱萸

一升 人參

麥門冬

五合去心

白朮

芍藥

各三兩

甘草

生薑

各一兩

右咬咀以水一斗二升煮雞汁取六升去雞下藥煎取二升內酒三升并膠烺盡取三升每服一升日三

補胎湯

若曾傷一月胎者當預服此

細辛

一兩

防風

二兩

乾地黃

白朮

生薑

四兩

吳茱萸

大麥

各五合

烏梅

一升

右咬咀以水七升煮取二升半分三服失食服○寒多者倍細

辛茱萸熱多渴者去之加瓜蒌根二兩○若有所思加栝子人

參○一方有人參二兩

艾葉湯

妊娠二月陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風

服此

艾葉湯 妊娠二月陰陽踴躍經有寒多懷氣不成有熱即禁中

寒有所動搖心滿臍下懸急腰背强痛卒有所下乍寒乍熱宜服此。

麻黃之用非

艾葉 丹參

當歸

麻黃

各一兩

人參

阿膠

各三兩

果有風寒者不可即果有

甘草

一兩

生薑

六兩

大棗

十二枚

風寒体虛者亦不可宜酌之

右咬咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服

○一方用烏雌雞一隻煮汁並頭血煎藥

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此

黃連

人參

各一兩

吳茱萸

五合

生薑

三兩

生地黃

五兩

一方用阿膠

一方用當歸

半兩

右咬咀以酢漿七升煮取三升分四服日三夜一十日一修合

若頗覺不安加烏梅一升水煎不用漿

生地為君黃連為臣似太寒矣而又佐以姜萸豈非中和之劑乎至於酢漿煮法并晝夜服法俱佳

雄雞湯。妊娠三月為定形。有寒大便青。有熱小便難。不赤即黃。

卒驚。熱。憂。愁。嘔。怒。喜。頓仆。動於經脈。腹滿。繞臍苦痛。或腰背卒

有所下。宜服此。

雄雞一隻。注如食法。

黃芩

白朮

生薑各一兩

麥門冬五合

芍藥

人參

茯苓

甘草

阿膠各二兩

大棗十二枚。劈。

右咬咀。以水一斗三升。煮雞減半。出雞。內藥。煮取牛。內清酒三

升。并膠煎取三升。分三服。一日令盡。○一方用當歸。川芎各二

兩。不用黃芩。生薑。

茯神湯。若曾傷三月胎者。當預服此。

茯神

丹參

龍骨各一兩

人參

當歸

阿膠

甘草各二兩

大棗二十枚。劈。

赤小豆二十粒。

○腰痛者。加桑寄生二兩。兩。麻子一升。白二

有寒有熱卒風寒或驚動是四症矣兩以之乃治之何耶總之有人參麥門歸甘等藥以植其本則雖有雜症之來餘藥自能調之

右咬咀以酢漿一斗者取三升分四服先日服七日後服一劑

○腰痛者加桑寄生三兩深師有薤白二兩麻子一升

菊花湯 妊娠四月有寒心下愴愴欲嘔胸膈滿不欲食有熱小

便難數數如淋臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀

腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下宜服此

菊花雞子大一枚

麥門冬一升

人參一兩

甘草

當歸各二兩

麻黃 阿膠各二兩

半夏四兩

生薑五兩

大棗十二枚

右咬咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三

服溫臥當汗以粉粉之護風寒四五日○一方用烏雌雞一隻

煮汁煎藥

調中湯 若曾傷四月胎者當預服此

白朮 枳實 李根白皮 厚朴 柴胡各三兩 白芍藥

生薑各四兩 當歸一兩 芎藭 續斷 烏梅升 甘草各一兩

右咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日後復服一

劑

阿膠湯 妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便

數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有

所下宜服此

阿膠四兩 人參一兩 當歸 芍藥 甘草 黃芩各二兩

麥門冬一升 吳茱萸七合 旋覆花二合 生薑六兩

右咬咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈不瘥再服○一方用烏雌雞

一隻割取咽血內酒中以水煮雞升煎減半內酒并膠煎取三升半分四服

安中湯 若曾傷五月胎者當預服此

黃芩 一兩

當歸

芎藭

乾地黃

人參 各二兩

甘草

芍藥 各三兩

麥門冬

五味子

大麻仁 各五兩

生薑 六兩

大棗 三十枚

右咬咀以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七

日復服一劑

麥門冬湯 妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脉滿身體

腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服此

麥門冬 一升

人參

甘草

黃芩 各二兩

乾地黃 三兩

此方似與驚怖卒有所下

以下諸症相
宜若腹滿
腫自有正方

呵膠四兩

生薑六兩

大棗十五枚

右以水七升者減牛內清酒二升并膠煎取三升分三服中間

進糜粥○一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

柴胡湯 若曾傷六月胎者當預服此

柴胡四兩

乾地黄五兩

白朮

芍藥一作紫葳

芎藭

麥門冬 甘草各二兩

薤白一兩

生薑六兩

大棗三十枚

一方有黃芩二兩

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間進糜粥勿食生

冷及堅硬之物七日更服一劑

葱白湯 妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷服若

傷寒煩熱腹滿氣短常苦頸項及腰背強

黃芩一兩

阿膠四兩

麥門冬

半夏各一

生薑八兩

此方妙在生
薑八兩然非
真若傷寒煩
熱氣血兩虛
者不可輕用

病在肺肺之
用至布散以
下諸藥皆補
肺而溫散酸
收者也甘草
粳米又補土

葱白

三四十寸長

黃芩

當歸

甘草

各三兩

人參

半兩

黃芩

一兩

阿膠

四兩

麥門冬

半夏

各一升

生薑

八兩

旋覆花

二合

右咬咀以水二升煮減半內清酒三升及膠煎取四升每服一升日三夜一溫臥當汗出若不出者加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗○一方以黃雌雞一隻割咽取血內酒中煮雞取汁以煎藥

杏仁湯

若曾傷七月胎者當預服此

杏仁

甘草

各二兩

紫苑

一兩

鍾乳

乾薑

各二兩

麥門冬

吳茱萸

各一升

五味子

三合

梗米

五合

右咬咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七

生金之藥

日服一劑。一方用白雞一隻。煮汁煎藥。

芍藥湯。

妊娠八月中風寒。有所犯觸。身體盡痛。乍寒乍熱。胎動

不安。常苦頭眩痛。繞臍下寒。時時小便白如米汁。或青或黃。或

時寒慄。腰背苦冷而痛。目眈眈。

補土生金散
寒除痛

芍藥

生薑各四兩

人參

白朮

當歸

甘草各三兩

厚朴五兩

薤白切一升

右咬咀。以水五升。清酒四升。合煮取三升。分四服。日三夜一。

一方用烏雌雞煮汁。以煎藥。

葵子湯。若曾傷八月胎者。當預服此。

葵子二升

芍藥四兩

白朮

柴胡各三兩

厚朴

甘草各二兩

生薑六兩

大棗二十枚

八月用葵子
當忌之

用烏雌雞一隻。煮汁煎藥。

當思之

甘草 略二 生薑 六兩 大棗 二十

右吸咀。以水九升。煮取三升。分三服。日三。凡十日一劑。○一方用烏雌雞一隻。煮汁煎藥。

半夏湯。妊娠九月。若卒得下痢。腹滿懸急。胎上衝心。腰背痛。不

可轉側。短氣。宜服此。

半夏 麥門冬 吳茱萸 當歸 阿膠 各三兩

乾薑 一兩 大棗 十二枚

九月獨言痢。宜日四服。即止。必有所見。然藥品燥熱。用宜斟酌。

右吸咀。以水九升。煮取三升。去滓。內白蜜八合。微火上溫服。四服。痢即止。○一方。雌烏雞一隻。煮汁煎藥。

豬腎湯。若曾傷九月胎者。當預服此。

豬腎 一具 白朮 四兩 茯苓 桑寄生 乾薑 乾地黃

芎藭 各三兩 附子 中者一枚 大豆 三合 麥門冬 一升

附子安胎。亦是奇局。苟非氣弱胎寒者。不可輕試。

右咬咀。以水一斗煮。腎令熟。去腎。內諸藥。煎取三升。分四服。
日三夜一。十日更一劑。

○惡阻

惡阻。謂嘔吐惡心。頭眩。惡食。擇食是也。○千金方云。凡婦人虛羸。
血氣不足。腎氣又弱。或當風飲冷太過。心下有痰水者。欲有胎而
喜病阻。所謂欲有胎者。其人月水尚來。顏色肌膚如常。但苦沉重。
憤悶。不欲飲食。又不知其患所在。脈理順時平和。則是欲有娠也。
如此經二月。日後便覺不通。則結胎也。阻病者。患心中憤憤。頭重。
眼眩。四肢沉重。懈惰不欲執作。惡聞食氣。欲嗽鹹酸果食。欲臥少
起。世謂惡食。其至三四月。日已上。皆大劇吐逆。不能自勝舉也。此
由經血既閉。水漬於臍。臍氣不宣通。故心煩潰悶。氣逆而嘔吐也。

惡阻俗爲病
熱然亦間有
不病者又不

所謂胎氣好
便宜服半夏茯苓湯數劑後將枳芩丸痰水消除便欲食也既得

拘於強弱此
所以故即俗
所謂胎氣好

惡阻亦有寒
熱不可不知

血脈不通經絡否澁則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如此候者
便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸痰水消除便飲食也既得
食力。体強氣壯力足養胎母便健矣。

大全云。妊娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如故脈息和順但覺
肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食醃酸甚者或作寒熱心
中憤悶嘔吐痰水恍惚不能支持巢氏謂之惡阻但証有輕重耳
經者不服藥亦不妨重者須以藥療之千金方以半夏茯苓湯茯苓
丸專治阻病然此二藥比來少有服者以半夏有動胎之性蓋
胎初結慮其易散不可不謹也張仲景傷寒論有用黃龍湯者小
柴胡湯中去半夏是也此蓋為妊娠而設焉王子亨則有白朮散
局方則有人參丁香散楊振則有人參橘皮湯齊士明則有醒脾

醒脾二字是
以盞之也

飲皆不用半夏用之多効

李茂翁云若左脈弱而嘔服諸藥不止者當服理血歸原藥則愈
經云無陰則嘔是也

薛氏云前證若中脘停痰用二陳藥加枳殼若飲食停滯用六君

子加枳殼若脾胃虛弱用異功散若胃氣不足用人參橘皮湯兼

氣腦加枳殼胸脇痞悶更加蘇梗脇痛再加柴胡若飲食少思用

六君子加紫蘇枳殼頭暈体倦用六君子湯若脾胃虛弱嘔吐不

食用半夏茯苓湯蓋半夏乃健脾氣化痰滯之聖藥也脾胃虛弱

而嘔吐或痰涎壅滯飲食少思胎不安必用半夏茯苓湯倍加白

朮然半夏白朮茯苓陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃予常用之驗

半夏茯苓湯治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食

半夏湯治七少白朮陳皮各一熟地黃附片者旋覆花無

有熱是內熱
有客熱是邪
熱桂心炒用
即不墮胎然
非真腹冷下
利者不宜
加大黃又是
一案

鹹酸多臥少起百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

半夏

湯洗七次薑汁炒黃

白朮

陳皮各一錢

熟地黃

响情者去之

旋覆花無痰

延不用桔梗

人參芍藥

川芎

甘草

各五分

右咬咀加生薑三片水煎空心服兼服後茯苓丸○千金方無

旋覆花有紫蘇葉細辛○有熱加黃芩○有客熱煩渴口瘡去

橘皮細辛加前胡知母各七分半○若腹冷下利去地黃加炒

桂心五分○若胃中虛熱大便秘小便赤澀去地黃加大黃七

分半黃芩一錢

陳皮半夏湯治懷妊氣血不足胎氣始盛逆動胃氣惡阻嘔吐

不進飲食

陳皮

去白朮水炒

茯苓

各一錢

半夏

製一錢半

子芩

澹姜汁炒枳殼

麩炒

補脾利氣行
痰水

此方有辛散
酸收之妙

紫蘇各八分 甘草炙五分

右切一劑生薑三片水一鍾煎七分食遠溫服

旋覆花湯 療妊娠六七月間胎不安常處亦治阻病

旋覆花五分 白木 厚朴 枳殼 黃芩 茯苓各一錢五分

半夏 芍藥 生薑各一錢

右咬咀作一服水煎食前溫服

縮砂二陳湯 治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏 陳皮去白 砂仁炒各一錢 白茯苓二錢 甘草炙五分

右加生薑三片棗一枚烏梅肉少許水煎服一二劑後服茯苓

丸

參橘散 治妊娠惡阻吐逆痰水不食心虛煩悶

厚朴各一錢 薑汁炒 甘草炙五分

重在心虛煩
悶故用麥門
竹茹

此方清而不
寒自是一法

清肺胃降逆
氣散滯氣而
不用半夏又
是一法

人參 橘皮 去白

茯苓 麥門冬 去心

白朮

厚朴 薑汁炒 各一錢 甘草 炙五錢

右作一服加生薑七片竹茹如彈子大水煎服

青竹茹湯 妊娠惡阻嘔吐不食

竹茹 彈子大一團 橘皮 白茯苓 各一錢半 半夏 湯泡七次 生薑 各二錢

右剉水煎溫服忌羊肉饒鮓等物

蘆根湯 治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生蘆根 七分 橘紅 四分 生薑 六分 檳榔 二分 枇杷葉 三分

右切以水二盞煎七分空心熱服

一方 治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹 麥門冬 各三兩 前胡 二兩 橘皮 一兩 蘆根 一兩

如體熱四肢煩熱加地骨皮一兩

右切細以水一大升煮半升去渣分兩服食前

人參半夏丸 治妊娠惡阻酸心胸腹冷痛吐逆不食

人參

半夏

湯泡七次

乾生薑

各半兩

生地汁浸蒸餅法不特制半夏之燥而又不傷血分妙妙

右為末以生地黃汁浸蒸餅為丸如桐子大每服四十九粒米飲下○婁氏曰大千方論半夏動胎而不用今仲景豈獨不知此而用於此方乎予治妊娠阻病累用半夏未嘗動胎也經云有故無殞是也

茯苓丸 治妊娠惡阻心中煩悶吐痰眩暈先服半夏茯苓湯兩

劑後服此藥

赤茯苓

人參

桂心

乾薑

炮

半夏

洗七次焙

陳皮

各一兩

前方用龜生薑此用炮薑

大補丸而炮而生又復有

右為細末煉蜜丸加桐子大每服五十九粒空心米飲下日三服

又用佳心亦
大熱矣而炮
而生又復有
別不可不知

乾葛根 白朮 甘草炙 枳殼去白 炒 黃芩各二兩

右為細末。煉蜜丸。加桐子大。每服五十丸。空心米飲下。日三服。

○一方加麥門冬。○肘後方加五味子。

歸原散。治妊娠惡阻。嘔吐不止。頭痛。全不八食。服諸藥無效者。

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥 丁香各半 白茯苓

白朮 陳皮各一兩半 桔梗炒 枳殼炒 各二錢半 半夏洗炒 黃

石咬咀。每服三錢。加生薑五片。棗一枚。水煎服。

橘皮湯。治妊娠嘔吐不下食。

橘皮 竹茹 人參 白朮各二錢 生薑一錢 厚朴二錢半

右剉水煎服。

惡阻惡食。責之脾虛。嘔吐責之有火。所謂諸逆衝上。皆屬於火。

也。此方竹茹能平少火。厚朴能下逆氣。橘皮生薑所以開胃。人參白朮所以益脾。開胃益脾欲其安穀云爾。

白朮湯。治胃虛惡阻吐水。甚至十餘日水聚不化者。

白朮炒

人參五錢

丁香二錢

甘草一錢

石為細末。每服二錢。加生薑五片。水煎食前溫服。

人參丁香散。治妊娠惡阻。胃寒吐逆。翻胃吐食。及心腹刺痛。

人參五錢

丁香

藿香各二錢半

右咬咀。每服五錢。水煎服。

二香散。治妊娠胎動不安。氣不开降。嘔吐酸水。起坐覺重。

香附子一兩

藿香葉

甘草各二錢

石為細末。每服二錢。沸湯調下。不拘時。

右爲細末。每服二錢。沸湯調下。不拘時。

白朮散。治妊娠胎氣不和。不進飲食。

白朮炒

人參

紫蘇各一錢

青皮去白

川芎

以上數條方
法俱備

訶子各八分

甘草各五分

右咬咀作一服。加生薑三片。水煎服。

保生湯。治妊娠惡阻少食。嘔吐或兼吐瀉作渴。

人參錢一

白朮炒

甘草炒

香附

烏梅一方作烏藥

橘紅各五分

右剉。加生薑水煎服。○覺惡心嘔吐。加丁香。

縮砂散。治妊娠胃虛。氣逆嘔吐不食。

縮砂仁爲末。每服二錢。生薑或米飲調服。

○胎動不安

健脾胃養血清
火則衝任自
足胎孕自安

大全云。妊娠胎動不安者。由衝任經虛受胎不實也。亦有飲酒居
室過度。損動不安者。有誤擊觸而胎動者。有喜怒氣字不舒。傷於
心肝。觸動血脈者。有信醫宜服煖補。反為藥所害者。有因母病而
胎動者。但治母病其胎自安。有胎不堅固。動及母疾。但當安胎其
母自愈。當以母形色察之。若面赤舌青。兒死母活。面青舌赤。口中
沫出。母死子活。若唇青兩邊沫出者。子母俱死。

安胎散。 妊娠常服安胎。

白朮

當歸各一錢

黃芩

一錢五分

甘草

炙五分

右剉水煎服。○如腹脹加神麴。麥芽各二分半。○氣虛泄瀉加
人參三分。陳皮二分。○潮熱加柴胡一錢。○氣上逆加枳殼三
分。

蒼朮湯。一常服健脾清熱。故胎不動。

子芩一兩

白朮五錢

右剉水煎服。○一方芩米各半兩。加當歸二錢。○一方用芩朮等分爲末。粥丸。桐子大。每服五十丸。白湯下。名安胎丸。

金匱當歸散。

此方養血清熱。孕婦宜常服之。如瘦人血少有熱。胎動不安。素曾半產者。皆宜服之。以清其源。而無後患也。

當歸

川芎

白芍藥

黃芩各一兩

白朮二兩

右爲末。每服二錢。酒飲調服。日再服。或用酒糊爲丸。如桐子大。每服五十丸。茶湯任下。日三服。

釣藤湯。

治妊娠八九月。胎動腹痛。面青冷汗。氣欲絕者。此由勞

動用力以傷胎宮。宜急治之。

鉤藤寄生膏
肝兼補氣血

鈞藤鈎

當歸

茯神去木

人參各一錢

桔梗五分

桑寄生五分

右剉水煎服。一方加石膏二錢半。

十聖散。治因母疾病氣衰血少不能護養其胎以致不安者宜

此主之。即十全大補湯加減

人參

黃耆

白朮

地黃

砂仁各五分

甘草炙

當歸

川芎

芍藥炒各一錢 川續斷八分

右剉水煎服。

黃耆湯。治胎動不安腹痛下黃汁。

黃耆

川芎各一兩

糯米二合

右細剉水二大盞煎至一盞三分溫服。

之陰所以補血氣之不足。痛不已用此藥探之。若不損則痛止。子母俱安。若胎損立便下。

糯米者穀味
之陰所以補
血氣之不足
乘天行之健
也

阿膠益金固
血艾葉助陽
上升則不
墜固則不流
故三方皆用
之

佛手散 治妊娠因事築碯胎動不安或子死腹中惡露不下疼

痛不已用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便下

當歸 去蘆酒 浸三錢 芎藭 二錢

右剉先用酒一鍾煎乾再入水一鍾煎三三沸溫服

小膠艾湯 治傷損動胎下血腹痛

阿膠 炒成珠 一兩 艾葉 二兩

右剉水煎服○指迷方加秦艽二兩

膠艾芎歸湯 治妊娠二三月上至八九月頓仆跌胎動不安腰

腹疼痛欲死已有所下

阿膠 川芎 各三兩 當歸 乾地黃 艾葉 各二兩

一方有甘草無地黃

右細切以水七升煮取三升半分三服

呵膠散 治妊娠或因傾仆或因毒藥胎動不安腰腹痛疼或有

所下

阿膠

蛤粉炒成珠

艾葉

炒

當歸

酒浸

川芎

白芍藥

炒

熟地黃

洗

黃耆

甘草

炙各一錢

右咬咀加生薑五片棗二枚水煎空心服

當歸湯 治妊娠胎動盪心煩燥悶絕口乾橫生逆產上衝下築

迷悶唇口青黑手足冷厥

當歸

人參

各二兩半

阿膠

炒一兩

甘草

各兩

右咬咀每服八錢加連翹葱白一莖水煎溫服○一方有川芎

○一方有川芎厚朴無甘草

二方平中之
奇且奏効最
捷

生地黃

益母草

當歸

黃耆

苗目去毒最
○一方有川芎厚朴無甘草

解毒良方

一方治妊娠從高墜下腹中下血煩悶

生地黄

益母草各一兩

當歸

黃蓍各半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑四片煎至六分去渣服無時

三物解毒湯治誤服毒藥動胎

甘草

黑豆

淡竹葉各等分

右用水煎濃服

白扁豆散治妊娠誤服諸般毒藥毒物

白扁豆生去皮爲細末米飲調服方寸匕神効或濃煎亦可

治漏下血妊娠經來

脈經云婦人經月下但爲微少師脈之反言有軀其後審然其脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之則滑浮之

則輕陽明少陰各如經法身反癰漸不欲飲食頭痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣盛當作血盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙妊二胎今陽不足故令激經也滑脈主血有餘今經又少故知孕○大抵妊娠經來不多而飲食精神如故六脈和緩滑大無病者血盛有餘也兒大能飲自不來也

大全云夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任脈虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝任之脈為經絡之海起於胞內手太陽小腸脈也手少陰心脈也是二經為表裏上為乳汁下為月水有娠之人經水所以斷者壅之養胎蓄之以為乳汁也衝任氣虛則胞內泄不能制其經血故月水時下亦名胞漏血

此言漏胎有三衝任虛者血海自虛也七情飲食胃

感也宿疾者

血虛者致胎動者母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故

案皆四有所
感也宿疾者
氣血失於榮
養也

血盡則人斃矣。又有因勞役喜怒衰樂不節飲食生冷觸冒風寒
遂致胎動。若母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故
令下血也。

曾有一娠婦月信不絕而胎不損問產科熊宗古答曰婦人血盛
氣衰其人必肥既娠之後月信常來而胎不動若晚進觀之便以
為漏胎若作漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮
今推宗古之言誠有旨也。巢氏曰婦人經閉不利別無所苦者是
謂有子以其經血蓄之以養胎壅之為乳汁也有子之後當以養
胎矣豈可復能散動耶所以然者有妊而月信每至是亦未必因
血盛也若謂婦人榮經有風則經血喜動以其風勝則可也既榮
經為風所勝則所來者非養胎之血以此辨之若作漏胎治之必

漏胎用風藥
亦是升肝
氣使血不漏
則胎自固不
但疎風已也

精悉

服保養補胎之藥。且胎不損。強以藥滋之。乃所謂實實虛虛也。其胎終墮宜矣。若醫者知榮經有風之理。專以一藥治風。經信可止。或不服藥。胎亦無恙。然而有胎本不固。而因房室不節。先漏而後墮者。須作漏胎治之。此又不可不審也。

方氏曰。胎動胎漏。皆下血。而胎動有腹痛。胎漏無腹痛。為異。爾故胎動宜行氣。胎漏宜清熱。

李氏曰。尿血。自尿門下血。漏胎。自人門下血。妊娠尿血。屬胞熱者。多四物湯。加山梔。髮灰。犀苦。賈萊。飲亦妙。因暑者。益元散。加升麻。煎湯下。稍虛者。膠艾四物湯。久者。用龍骨一錢。蒲黃五錢。為末。酒調服。

孤癰預下。必倚而墮。此氣

薛氏曰。胎漏黃汁下。或如豆汁。若因肝脾濕熱。用升陽除濕湯。血

血兩虛也

孤漿預下故也

薛氏曰胎漏黃汁下或如豆汁若因肝脾濕熱用升陽除濕湯血崩肝脾風熱用加味道遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯脾胃氣虛用錢氏白朮散若脾氣下陷用補中益氣湯肝經風熱用防風黃芩丸風入腸胃用胃氣湯

加減膠艾湯治胎動漏血有效

阿膠炒成珠

當歸

川芎

白芍藥炒

地榆各一錢

艾葉炒

甘草各五分

右剉一服水煎饑服○胎漏血多起於氣惱血逆火動之故可加炒黃芩炒香附炒砂仁研細同煎○或有受胎至四五個月卽墮或至六七個月漏血要墮者宜前方去艾葉地榆加白朮

黃芩、茯苓、熟地黃、續斷。○有氣盛，亦加香附、砂仁。○氣虛，加入參、黃耆之類。○如傷墮多次，受孕後，便宜服于金紫蘇飲及前加減法。湯丸相間，庶免再墮。

安胎飲。治妊娠卒然腰痛，下血不已。

當歸

川芎

白芍藥

炒

熟地黃

阿膠

炒

艾葉

黃耆

各一錢

甘草

炙

地榆

各五分

右剉一劑，加薑棗水煎服。

太全方。

治妊娠三四月腹痛，時時下血。

當歸

熟地黃

艾葉

各六兩

續斷

阿膠

雞蘇

竹茹

各一兩

右用水一升，煎取七合，空心再服。

鯉魚皮之用

鯉魚皮

當歸

白芍藥

熟地黃

川芎

右用水一升煎取七合空心再服

鯉魚皮之用
奇

如聖湯 治胎動腹痛或為胎漏

鯉魚皮 當歸酒浸 白芍藥 熟地黃酒蒸 川芎

川續斷酒浸 阿膠蛤粉炒 甘草炙各等分

右咬咀每服四錢加苧根少許生薑五片水煎溫服

安胎當歸湯 治妊娠舉動驚悸胎不安小腹痛引腰絡下血

當歸 川芎 阿膠炒 人參各一兩 大棗十二枚

艾葉一把 一方有甘草無參棗

右以水酒各三升煮至三升內膠令烱分三服

枳殼湯 治胎漏下血及因事下血

枳殼去穰 黃芩各半兩 白朮一兩

右剉水煎食前溫服○一方加生地八少酒煎

白朮為君不用血藥是
一法

當歸寄生湯 治妊娠胎漏非時下血

當歸

川芎

艾葉

白木各一錢 人參

桑寄生

續斷

熟地黃各二錢

右水煎空心溫服

二黃散

治婦人胎漏下血

生地黃

熟地黃各等分

右為細末每服二錢煎白木枳殼湯調食前服或咬也水煎服

白木枳殼煎湯調地黃末意見超卓

阿膠散

治妊娠無故卒然下血

阿膠

蛤粉炒成珠二兩為末

生地黃

半觔搗取汁

右以清酒三升攪勻溫熱分三服

一方

治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

用清酒炒

右同煎三五沸溫三服以止為度

二方 治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

生地黄汁升 陳酒五合

右同煎三五沸溫三服以止為度

榆白皮散 治妊孕胎漏去血恐其難產常宜服之

榆白皮 葵根 大麻仁 瞿麥各二錢 木通錢二

牛膝 酒浸焙 一錢半

右咬咀水煎遍服

一方 治妊娠忽暴下血數升胎燥不安

榆白皮二兩 熟地黄四兩 當歸 生薑各二兩

葵子一升肘後方不用

右剉以水五升煮取二升半分三服不瘥更作服之

子芩散 治肝經有熱妄行下血

齊陰綱曰

卷八 胎漏下血

三五

此方治胎燥則可若脾虛滑泄者禁用

細條黃芩炒爲末每服一錢以枳槌燒赤淬酒熱調服若脾胃虛不宜用

防風丸 治肝經不風以致血得風而流散不歸經

防風爲末每服一錢白湯調服

防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便血尿血

條芩炒焦 防風各等分

右爲末酒糊丸如桐子大每服三五十丸食遠或食前米飲或

溫酒送下

○右三方治肝經風熱之劑

桂枝茯苓丸 仲景云婦人宿有癥病經斷來及三月而得漏下

不止胎動在臍上者爲癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利

下其癥桂枝茯苓丸止之張氏曰凡胎動多當臍下動在臍上故知是癥也

凡遇此瘕
宜斟酌

時胎下血者後斷三月經也。所以血不止者其瘕不去故也。當下其瘕。桂枝茯苓丸止之。張氏曰凡胎動多當臍今動在臍上故知是瘕也。

桂枝

茯苓

牡丹皮

桃仁

去皮尖炒

芍藥各等分

右五味末之。煉蜜丸如兔屎大。每日食前服一九。不知加至三九。

本事方。治胎漏下血不止。

取桃樹上乾不落桃子燒灰和水服瘕。本草云桃奴破血。又治伏梁氣積。

○右二方治瘕病破血之劑。

大。全。方。治。姙。娠。忽。然。下。黃。汁。如。膠。或。如。豆。汁。等。物。或。胎。動。腹。痛。

黃著

炒大兩

糯米五合

黃赤為熱故用芎根以涼之下黃赤為肝氣之疎泄故重用銀以鎮之

右以水七升煎取二升分為四服

銀芎酒 治妊娠下黃汁或如赤豆

芎根

去黑皮切二兩

銀五兩或金銀首飾

右用水酒各一大盞煎服

○右二方治漏下黃豆汁之症

○煩躁

即子煩附口乾

大全云妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六月受少

陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子煩也產寶云

夫妊娠而子煩者是肺臟虛而熱乘於心則令心煩也停痰積飲

在心胸之間或衝於心亦令煩也若熱而煩者但熱而已若有痰

飲而煩者嘔吐涎沫惡聞食氣煩躁不安也大丹妊娠之人既停

肺虛乘熱於心於理似皆虛在虛字上看

安為子煩也

飲而煩者。嘔吐涎沫。惡聞食氣。煩躁不安也。大凡妊娠之人。既停。

痰積飲。又寒熱相搏。氣鬱不舒。或煩躁。或嘔吐涎沫。劇則胎動不
安。均爲子煩也。

煩燥口乾屬
心脾與子煩
大同小異

薛氏曰。前証若因內熱。用竹葉湯。氣滯。用紫蘇飲。痰滯。用二陳白
水。黃芩枳殼。氣鬱。用分氣飲。加川芎。脾胃虛弱。用六君。紫蘇。山梔。
大全云。妊娠煩燥口乾者。足太陰脾經其氣通於口。手少陰心經。
其氣通於舌。若臟腑氣虛。榮衛不理。致陰陽隔絕。熱乘於心脾。津
液枯少。故令心煩而口乾也。與子煩大同小異。宜用知母丸。

薛氏曰。前証若胃經實火。用竹葉石膏湯。若胃經虛熱。用人參黃
耆散。若胃經氣虛。用補中益氣湯。若肺經虛熱。用紫蘇飲。若肝經
火動。用加味道遙散。若脾氣鬱結。用加味歸脾湯。若腎經火動。如
味地黃丸。

竹葉湯 治妊娠心驚膽怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓三錢 麥門冬去心 防風 黃芩各二錢

右作一服加竹葉十片水煎服無時○一方有知母無黃芩○

一方有人參無黃芩

知母飲 治妊娠心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

知母 麥門冬去心 赤茯苓各一錢半 黃芩 黃耆各二錢

甘草錢

右作一服水二鍾入桑白皮半錢煎至一鍾再入竹瀝些少同

煎一二沸服無時

犀角散 治子煩

犀角尖磨水時入 地骨皮 條芩 麥門冬去心 甘草五分

右切作一服水二鍾煎八分入竹瀝一合溫服

壅熱用黃芩
要知是虛非
實

犀角尖磨水 地骨皮 條芩 麥門冬去心 甘草五分

赤茯苓各二錢

右切作一服。水二鍾煎八分。入竹瀝一合。溫服。

當歸飲。治子煩。

當歸二錢 酒洗

川芎

阿膠珠

豆豉

桑寄生各一錢

川豆豉川芎散熱。又是一法。

葱白七至

右剉水煎溫服。

人參散。治妊娠熱乘心脾。津液枯少。煩躁乾渴。

人參

麥門冬去心

赤茯苓

地骨皮

乾葛

黃芩炒

犀角鎊各七錢五分

甘草半兩

右剉。每服三錢。水煎服。

竹茹湯。療妊娠煩躁。或胎不安。

清心涼肝妙劑

用淡青竹刮茹二兩。以水一大升。煮取四合。徐徐服盡為度。

葱白握一 豉分二

右以水二大盞。煎至一盞半。去滓。溫分三服。

一母丸。治妊娠因服藥致胎氣不安。有似虛煩。不得眠。巢氏謂之子煩也。醫者不知。作虛煩治之。損動胎氣。宜矣。

知母洗焙二兩

為細末。蜜肉丸如彈子大。每服一丸。煎人參湯

下。

○心腹脹滿即子懸

此雖言寒氣停飲所致。然大概陽氣壅滯。則令上滿。

大全云。妊娠心腹脹滿者。由腹內素有寒氣。致令停飲。重飲觸冷。飲發動。與氣相爭。故令心腹脹滿也。

心腹故以紫
蘇飲寬氣下
氣為主餘隨
症加減

薛氏曰前証若外感風寒內傷飲食用藿香正氣散若食傷脾胃
用六君子湯若陽氣壅滯胎上逼心用紫蘇飲
一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養胃湯加青皮山查枳殼
其脹益甚其胎上攻惡心不食右閃脈浮大按之則弦此脾土不
足肝木所侮用六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益
氣升舉脾氣而瘥

一妊婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫胃寬氣等藥服之反吐
轉加脹滿湊心驗之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯
其論曰妊婦通身腫滿或心胸急脹名曰胎水遂去妊婦胸前看
之胸肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消脹去方
得分娩死胎此証蓋因懷妊腹大不自知覺人人皆謂娠孕如此

以火盛極而
連進紫蘇飲
人恒失之須
知是氣作悶

附子胎前禁
用而此以治
藏寒正所謂
有故無煩也

終不知胎水之為患也

李氏曰子懸者心腹脹滿痛也。妊孕四五個月以來相火養胎以致胎熱氣逆。心腹脹滿疼痛宜紫蘇飲有鬱心腹脹滿甚者加莪朮及丁香少許不食者芩朮湯倍白朮加芍藥。

火盛極一時心氣悶絕而死紫蘇飲連進救之。

此証兩尺脈絕者有誤服動胎藥子死腹中則增寒手指唇爪俱青全以舌為証驗芎歸湯救之。

仲景云婦人懷妊六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹

如扇所以然者子藏寒故也當以附子湯溫其藏。

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以上重如有水氣狀懷身七

月太陰當養不養此心氣實當刺癰勞宮及關元小便微利則愈。

此方無川芎

月太陰當養不養此心氣實當刺膈勞宮及關元小便微利則愈

紫蘇飲 治胎氣不和氣上心腹脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產

驚恐氣結連日不下 一方無川芎各七寶散

紫蘇葉二 大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮去

當歸各一 人參 甘草各五分

右劉作一服加生薑三片葱白七寸米煎服

本事方云曾有一婦累日產不下服遍催生藥不驗予曰此必坐草太早心懷一點懼氣結而不行然非不順也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦脹氣乃不行矣得此藥一服便產及婦人六七月子懸者予用此數數有驗不十服胎便近下

陳方甫治一婦有孕七箇月遠歸忽然胎上衝心而痛坐臥不

安兩醫治之無效。遂說胎已死也。用草麻子研爛和麝香調貼臍中以下之。命在垂亡。召陳診視。兩尺脈絕。他脈平和。陳問二醫作何證治之。答曰死胎也。陳曰何以知之。曰兩尺脈沉絕。以此知之。陳曰此說出何經。二醫無答。陳曰此子懸也。若是胎死却有辨處。面赤舌青。子死母活。面青舌赤。吐沫母死子活。唇口俱青。子母俱死。今面不赤。口不青。其子未死。是胎上逼心。宜以紫蘇飲治之。至十服而胎近下矣。

訶黎勒散

療妊娠心腹脹滿。氣衝胸膈煩悶。四肢少力。不思飲食。

訶黎勒

赤茯苓

前胡

各一兩

陳皮

大腹皮

桑白皮

各七兩

枳殼

川芎

白朮

各半兩

桑白皮 枳殼 川芎 白朮 各半
右為粗末。每服四錢。薑三片。棗二枚。水煎服。

保胎和氣飲。專治胎前四五個月。身體困倦。氣急發熱。飲食無

味。貪睡頭暈等証。

枳殼四不

厚朴

香附子各三不

砂仁

蒼朮

橘紅名二不

蘇葉一不

甘草五不

小茴香一不

右剉分作三服。每服用水一鍾半。煎七分服。

瘦胎飲。專治胎前五六個月。胎前困弱。體重貪睡。食不知味。肚

腹胎動。

當歸二不

白芍藥

益母草

枳殼各四不

砂仁

香附子

益智各三不

甘草一不

右剉分作三服。每服水一鍾半。煎至七分。空心溫服。

枳殼湯。治婦人妊胎腹脹。

枳殼三兩

黃芩二兩一方只用一兩

右為粗末。每服五錢。水煎服。○如腹滿身體沉重。加白朮二兩。葱白湯。治胎上逼心煩悶。又治胎動困篤。

葱白安胎人所未知

用葱白二七莖。濃煮汁飲之。若胎未死即安。已死即出。未效再服。○巢全善云。此方神效。脈浮滑者宜之。本草云。葱白通陽氣安胎。

一方。治胎動上逼心痛。

取艾葉如雞子大一團。以頭醋四升。煎至二升半。溫服。

倉公下氣湯。治心腹兩脇脹悶。飲食少思。四肢無力。

羌活 檳榔 青皮 大腹皮 赤芍藥

妙在煎服

羌活 檳榔 青皮 大腹皮 赤芍藥

甘草多 陳皮 赤茯苓 牛黃量 桑白皮各

桂心二 紫蘇葉二

右剉加生薑五片棗一枚水煎服

當歸湯 治胎動衝心煩悶欲死安胎止痛

當歸洗酒 川芎 人參 阿膠 甘草炙各

連根葱白一握

右細剉以水二升煎四味至升半去渣下葱再煎減三合入阿

膠溫服一劑分二三服

大聖散 治婦人恹恹睡中多驚腹脇膨脹坐臥不寧

白茯苓 川芎 黃菁蜜炙 當歸酒浸 麥門冬去心各

人參 甘草多 木香不見火

齊陰綱目 卷八 心腹脹滿

此症禁用白
水而此方獨
用白木為君
非認症之確
者不可

右咬咀加生薑五片水煎服

治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白木五兩

黃芩二兩

芍藥四兩

右用水六升煮取二升半分三服

一方治妊娠心下滿氣急切痛

赤茯苓六分

桑白皮五分

前胡四分

郁李仁

檳榔各三分

右為細末以水一升煮取一半去滓夜臥服

安胎和氣飲治胎冷腹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子麝畏根去核

白木名二

陳皮去白

高良薑炒

木香不見火

白芍藥

陳米炒

一甘草炙名一不

右作一服生薑五片水煎服忌生冷之物

右作一服生薑五片小煎服忌生冷之物

仲景附子湯。婦人懷妊六七月。脹弦發熱。其胎愈脹。腹痛惡寒。

者。少腹如扇。所以然者。子臟寒故也。當以此湯溫其臟。

附子二枚炮去皮破八片 白朮四兩 茯苓 芍藥 人參二兩

右五味以水八升煮取三升去渣溫服一升日三服。

心痛

大全云。妊娠心痛。乃風邪痰飲交結。若傷心正經為真心痛。旦發夕死。夕發旦死。若傷心支絡。則乍安乍作。若傷於子藏。則胎動而血下。

薛氏曰。前證若飲食所傷。用平胃散。加枳殼。山楂。若因錯雜諸邪。當審其因而治之。

一妊婦心痛。煩熱作渴。用白水散即愈。後因停食。其痛仍作。胸腹

脹滿按之則痛此因飲食停滯用人參養胃湯按之不痛乃脾胃受傷以六君子湯補之而愈

一姪婦心腹作痛胸脇作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山楂山梔青皮木香而愈又因怒仍痛胎動不食面色青黃肝脈弦緊脾脈弦長此肝脈乘土用六君子湯加升麻柴胡木香而愈
火龍散 治姪娠心氣疼

此方治平常
心藏亦效

川楝子

茴香

炒名
三錢

艾葉末

鹽炒一
錢半

右作一服水三鍾煎至一鍾不拘時服

產寶丸

治姪娠卒心痛氣欲絕

川芎

當歸

茯苓

厚朴

製各
一兩

右用水六升煎取三升分三服

右用水六升煎取二升分二服

白朮湯 治妊娠卒心痛欲死不可忍者

豈以心痛而

可用白朮者詳之

白朮二兩

赤芍藥二兩

黃芩一兩

右切以水六升煮取三升半分三服半日令盡微下生忌桃李

雀肉等

千金方 療妊娠心痛

按此可治燥熱心痛

青竹茹一升

羊脂八兩

白蜜三兩

右三味合煎每服聚核大三枚食前頓服日三服

一方 治妊娠忽然心痛悶絕欲死者謂之中惡

生地黄二錢

枳殼一錢

木香三分

右剉酒煎服

一方

橘皮二兩

豆豉五兩

右為末煉蜜為丸如桐子大溫水下二七丸無時

雜方

青竹茹一升酒二升煮取一升半去滓分溫頓服

三方破雞子一枚酒調服之

二方大麻子三升研水八升煮取五升分五服

補遺

沉香降氣湯

茯苓補心湯

四七湯

此治瘀血煩

紫蘇飲皆可用炮炙論云心痛欲死急覓延胡

心腹痛

心腹痛

心腹痛

大全云。妊娠心腹痛者。或由宿有冷疼。或心觸風寒。皆由臟虛而致動也。邪正相擊而并於氣。隨氣上下。上衝於心。則心痛。下攻於腹。則腹痛。故令心腹痛也。妊娠而痛者。邪正二氣交攻於內。若不時差者。其痛衝擊胞絡。必致動胎。甚則傷墮也。又云。妊娠心腹疼痛。多是風寒濕冷。痰飲與臟氣相擊。故令腹痛攻衝不已。則致胎動也。

薛氏曰。前証若風寒痰飲。用金沸草散。雜病咳嗽。胎氣鬱結。加香附。川芎。若飲食停滯。用六君。加紫蘇。枳殼。若怒動肝火。前藥更加柴胡。山梔。若鬱結傷脾。用歸脾湯。加枳殼。山梔。

一。妊婦心腹作痛。吐痰惡心。胎氣上攻。飲食少思。此脾虛氣滯而

為痰用六君子加柴胡枳殼諸証漸退飲食漸進又用四君子加枳殼山楂桔梗而安後因怒兩脇氣脹中脘作痛惡寒嘔吐用六君加柴胡升麻木香一劑而愈
川芎散 治妊娠素有冷氣忽心腹痛如刀刺

川芎

當歸各一錢

人參

吳茱萸

厚朴薑製各五分

茯苓

桔梗各四分

芍藥七分

枳殼

甘草各二分

石劑水煎稍熱服

當歸芍藥散

治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產後崩中去血

過多眩暈虛乏

白芍藥炒四兩

當歸

茯苓

白朮各二兩

澤瀉

川芎各一兩

產後忌為藥而此方兼治且以為君愚謂產後惟去血過多君可用若患露不

可用也

同膠收 治妊娠胎動不安 胎前產後 諸症 宜服此散 勿用飲食

行作痛者不可用也

胎動方中多用艾葉而此則用白朮者蓋不治痛而治不思飲食也妙在當歸陳皮為君

右為細末每服二錢食前溫調服

阿膠散治妊娠胎動腹中疔痛不思飲食

當歸炒

陳皮名一兩

白朮

白茯苓

阿膠炒

川芎

各七錢半

甘草

二錢半

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分服

一方治妊娠患腹痛并胎動不安

當歸三兩

川芎

阿膠

人參

厚朴

各一兩

葱白

切一升

右咬咀以水七升煎至三升分三服一方有甘草無厚朴川

芎

香義散

治妊娠五個月以後常胸膈間氣刺痛滿或腸鳴以至

嘔逆減食。此由喜怒憂慮過度。飲食失節之所致也。蔡元度寵人有子。夫人怒欲逐之。遂病。醫官王師復處此方三服而愈。

廣中莪茂

炒一兩

丁香

半兩

粉草

二錢半

右爲細末。空心鹽湯點服。一大錢。覺胸中如物按下之狀。

克錄驗方。療妊娠腹內冷痛。忽胎動。

薤白

一升

當歸

切四兩

右以水五升。煮取四升。作三服。

一方。治妊娠胎動欲落。腹中痛不可忍。

上等銀

一斤

茅根

二斤去黑皮

右以水九升。煮銀取五升。八清酒一升。同煎茅根。取三升。分三服。立安。

銀根解熱護胎。法俱妙。於休弱暴病者可用。

血熱血虛腹痛若此方甚妙

一方治妊娠痛腹

用生地黃三斤搗酒一升合煎減半頓服愈

一方治妊娠四五箇月忽然腹痛

大棗

十四枚炒令黑

鹽一錢炒令赤

右爲末取一撮許酒調服即愈一方單用棗十四枚燒存性

爲末童子小便調下一方單用鹽一斤燒令赤以兩指取一

撮酒調服

腹痛即子痛

仲景云婦人懷胎腹中諸疾痛當歸芍藥散王之脈經曰婦人有

胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死令人摸之如覆杯者則

男如肘頸參差起者女也冷者何面冷者爲死溫者爲生

所謂何面者意在腹之左右也

氣虛者可用。

薛氏曰：若腹中不時作痛，或小腹重墜，若胎痛，用地黃當歸湯。未應加參朮陳皮，或因脾氣虛，用四君子加歸地，中氣虛用補中益氣湯。

地黃當歸湯。治婦人有孕胎痛。

血虛痛如。

當歸兩

熟地黃兩

右為末，作一服水三升，煎至一升，去滓頓服。○未效加入參白

朮陳皮。

加味四物湯。治血少胎痛。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

香附子

各等分

右為末，每服三錢，紫蘇湯調下。

小腹痛。

妙在紫蘇湯。

大全去妊娠小腹疼痛者由胞絡虛風寒相搏痛甚亦令胎動也
薛氏曰前証若風寒所搏用紫蘇飲加生薑氣血虛用八珍湯脾
氣虛用六君子湯中氣虛用補中益氣湯若腹脹痛用安胎飲加
升麻白朮不應兼補中益氣湯

一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小
柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水
道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸証
頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安
療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸

川芎

各八分

阿膠

人參

艾葉

各四分

茯苓

大棗

各二十個

右細切以水四升煮取三升酒分三服

補遺方

治妊娠小腹痛胎動不安

川芎爲細末酒調下。一方用川芎當歸等分煎服

腰腹及背痛

大全云腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之故腰痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則胞墮也

薛氏曰前証若外邪所傷用獨活寄生湯勞傷元氣用八珍湯加杜仲砂仁阿膠艾脾腎不足以前藥加白朮補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳殼肝火所動用小柴胡湯加白朮枳殼山梔肝脾鬱結用歸脾湯加柴胡枳殼

脾鬱結用歸脾湯加柴胡枳殼

一妊婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致用拔萃羌活湯一劑而愈又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固本而痊

汪石山治一婦懷妊八月當病腰痛不能轉側大便燥結醫用人參等補劑痛益加用硝黃通利之藥燥結雖行而痛如故汪診之脈稍洪近駛曰血熱血滯也宜用四物加水香乳沒黃柏火麻仁煎服四五貼痛稍減燥結潤復加發熱面赤或時惡寒仍用前方去乳香沒藥加柴胡黃芩服二貼而寒熱除又背心覺寒腹痛復作汪曰血已利矣可於前方加入參一錢服之而安

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神效

破故紙 瓦上炒香爲末

右先嚼胡桃肉一個爛後以溫酒調下故紙末三錢空心服

五加皮散 治妊娠腰痛不可忍或跨痛先服此散

杜仲 四兩 炒

五加皮

阿膠 炙另

防風

狗脊

川芎

白芍藥

細辛

草薺 各三兩

杏仁 皮尖麤炒

右咬咀以水九升煮取二升去滓下膠作三服

五加皮丸

治妊娠腰痛不可忍者次服此丸

續斷 炒

杜仲 各二兩半 芎藭

獨活 各三兩

五加皮

狗脊

草薺

芍藥

訶子肉 各四兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四十丸空心酒下日三服

療觸動胎以致腰痛背痛

杜仲

五加皮

當歸

芍藥

川芎

草薺 各等分

此與前方不甚相遠而以杏仁易訶子通寒涼同者此宜詳之

右為末每用三錢空心酒調下

療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸三兩

阿膠

甘草各二兩

葱白切二升

右細剉以水七升煮取三升去滓分溫三服

小品苧根湯

療損動胎腰腹痛去血胎動向下

生地黄

苧根各二兩

當歸 芍藥

阿膠

甘草各一兩

右細切以水六升煮取二升去滓內膠煎烺分溫三服忌海藻

蕪荑

大地黃丸

治產前後腰腹痛一切血疼兼治血氣虛四肢不舉

骨髓熱疼

熟地黄二兩

烏梅肉

當歸各一兩

此方不特產前後妙即平日血虛內熱者亦宜

右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸空心白湯嚼下

紫酒 治妊娠腰痛如折亦治常人卒腰痛者

大黑豆二合炒令香熟酒一大盞煮取七分去豆空心頓服

雜方

治胎動腰痛捨心或下血取葱白不拘多少濃煎汁飲之

一方用鹿角長六寸燒令赤酒中淬再燒再淬以角碎爲度取酒飲之鹿角爲末服方寸匕

一方用菖蒲汁酒一升服之

一方用艾葉一把如雞子大以酒四升煮取二升分爲二服良

○胎水腫滿 卽子腫子滿子氣

產寶論曰妊娠腫滿由臟氣本弱因妊重虛土不尅水血散於四

產寶論曰：妊娠腫滿，由臟氣本弱，因妊重虛土，不克水，血散於四肢，致腹脹手足面目皆浮腫，小便秘澀，陳無擇云：凡婦人宿有

風寒，冷濕，妊娠喜腳腫，俗呼爲皺腳，亦有通身腫滿，心腹急，別名

曰胎水。

論曰：凡妊娠之人，無使氣極，若心靜氣和，則胎氣安穩。若中風寒，邪氣及有所觸犯，則隨邪而生病也。凡妊娠經血壅閉，以養胎，若忽然虛腫，乃胎中挾水，水血相搏，脾胃惡濕，身之肌肉濕漬，氣弱則肌肉虛，水氣流溢，故令身腫滿也。然其由有自或因泄瀉下痢，臟腑虛滑，耗損脾胃，或因寒熱瘧疾，煩渴引飲太過，濕漬脾胃，皆能使頭面或手足浮腫也。然水漬于胞，兒未成形，則胎多損壞。及臨產，曰腳微腫者，乃胞藏水少，血多，水出於外，故現微腫，則易生也。宿有寒氣，因寒冷所觸，故能令腹脹滿腫也。

子氣者因子
而肝脾氣但
土遂不能制
水故一香附
散足以療之
然不服藥亦
無害

產乳集論曰妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以來
行步艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水出
者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝任經有血
風未可妄投湯藥亦恐大段甚者慮將產之際費力有不測之憂
故不可不治於未產之前也古方論中少有言者元豐中淮南陳
景初名醫也獨有論治此証方名初謂之香附散李伯時名曰天
仙藤散也

薛氏曰前証若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛
弱佐以四君子若面目虛浮肢體如水氣用全生白朮散如未應
用六君子湯脾虛濕熱下部作腫用補中益氣加茯苓若飲食失
宜嘔吐泄瀉用六君子湯若腿足發腫喘悶不安或指縫出水用

天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如未應用補中益氣加茯苓若飲食失

宜嘔吐泄瀉用六君子湯若腿足發腫喘悶不安或指縫出水用

天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如未應用補中益氣湯若脾肺

氣滯用加味歸脾湯佐以加味逍遙散

白朮散治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰子腫

白朮二錢 茯苓一錢 陳皮 生薑 大腹皮

桑白皮一錢

右剉水煎服或為細末每服三錢米飲調下○本方去白朮名

五皮散或加水香

水通散治妊娠身體浮腫四肢脹急小便不利

水通 香薷 紫蘇莖葉各一錢 枳殼炒 檳榔

條芩各五分 水香 訶子皮各三分

右剉加生薑三片水煎食前服

子腫與子氣相類然子氣在下子腫在頭面須識

補脾瀉肺利
大腸

鯉魚治懷妊
身腫及胎氣
不安食又不
下水氣利小
便

葶藶散 治妊娠遍身洪腫

葶藶子一兩

白朮五兩

茯苓

桑白皮

郁李仁

各二兩

右為粗末水六升煎取二升分三服小便利即瘥

千金鯉魚湯

治妊娠腹脹滿或渾身浮腫小便赤澀

當歸

白芍藥各一錢

白茯苓一錢半

白朮二錢

橘紅五分

鯉魚尾一尾

右作一服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚用汁一盞半入生薑

三片煎至一盞空心服胎水即下如未盡腹悶未除再合一劑

服之

一方

澤瀉

葶藶名二兩

茯苓

枳殼

白朮

各六兩

子滿大都在五六月以後病此氣與腫不同蓋胎大則腹滿滿則氣浮遍身腫邪無所挾但一瀉氣利水則愈

右剉以水六升煮取二升半分溫二服

防已湯治妊娠脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利

防已半錢桑白皮炒紫蘇莖葉赤茯苓各二錢木香五分

右剉一服加生薑四片水煎服如大便不通加枳殼檳榔

澤瀉散治妊娠遍身浮腫上氣喘急大便不通小便赤澀謂之

子滿

澤瀉桑白皮炒木通枳殼炒檳榔

赤茯苓各一錢半

右剉一服加生薑五片水煎服

天仙藤散治妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫至腿膝

行步艱難喘悶妨食狀似水氣甚至足指間有黃水出者謂之

齊合綱目

卷八 胎水腫滿

四三

子氣

天仙藤 洗累炒即青木香藤

香附子 炒

陳皮

甘草

烏藥

木香 各等分一方作木瓜

右剉每服五錢加生薑三片紫蘇五葉水煎日三服腫消止藥

產寶方 療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓 四兩 杏仁 檳榔 各三兩 旋覆花 郁李仁 各兩

右為粗末以水六升煮取二升去滓分溫三服小便通即瘥

崔氏方 療妊娠體腫有水氣心腹急滿

茯苓 白朮 各四兩 旋覆花 二兩 杏仁 黃芩 各三兩

石細切以水七升煮取二升半分溫三服忌桃李雀肉酢物

腎着湯 治妊娠腰脚腫

以下三方不甚相遠但郁李與白朮補瀉不同黃芩與乾薑冷熱不同而旋覆散結痰杏仁瀉肺氣亦略相似惟在用者審之

白木錢 甘草錢 杏仁牛

腎着湯 治妊娠腰脚腫

茯苓

白朮 各二錢

乾薑 強

甘草 各一錢

杏仁 半錢

石咬咀水煎服

子和方

治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴

猪苓五兩為末以熱水調服方寸七日三服

即仲景猪苓湯法而服法更巧

腹哭鐘鳴

產寶方

治小兒在腹中哭及孕婦腹內鐘鳴

用空房下鼠穴中土一塊令孕婦噙之即止或為末入麝香

少許酒調下二錢立愈然麝香開竅當酌量用之

補遺方

治孕婦腹中見哭

用黃連濃煎汁母常呷之即止

一法

小兒腹哭者蓋臍帶上疙塔兒含口中因娠婦登高舉臂

有令孕婦以
笥箒掃地即
止者亦此意

脫出兒口以此作聲令姪婦曲腰就地如拾物仍八兒口即止
積聚

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞帝曰願聞其故
岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死
丹溪方 治血塊如盤有孕難服峻劑此方主之

香附子

醋炙 四兩

桃仁

去皮尖 一兩

海粉

醋炙 二兩

白朮

一兩

右爲末麪糊丸服

